



**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА**



КАТАЛОГ

сортів і гібридів овочевих
та баштанних рослин





Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук – головна наукова галузева установа (рік заснування – 1947).

Сорти селекції інституту мають високі смакові якості, придатні як для механізованого, так і звичайного вирощування, транспортабельні, лежкі, для свіжого споживання і консервування, соління, виготовлення соків та джемів, пристосовані для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

Інститут реалізує широкий асортимент добазового, базового та сертифікованого насіння овочевих, баштаних, зеленних, пряно-смакових видів рослин; овочеву продукцію власного виробництва (в тому числі сертифіковану органічну продукцію).

Інститут пропонує вирощування насіння овочевих і баштаних рослин на замовлення; агрономічний авторський супровід енергоефективних та біологізованих технологій вирощування овочевої продукції; надання рекомендацій щодо впровадження ґрунтозахисних сівозмін, систем обробки ґрунту та догляду за рослинами; комплексну діагностику основних функціональних та інфекційних захворювань овочевих і баштаних культур; консультації з питань захисту овочевих рослин від шкочинних організмів; розробку систем удобрення овочевих культур за результатами агрохімічного обстеження полів та діагностики живлення рослин; розроблення технологічних карт, бізнес-планів, бізнес-проектів, виробничих програм, інноваційно-інвестиційних проектів виробництва овочевої продукції в різних ґрунтово-кліматичних зонах; проведення лекцій та консультацій з технологічних та селекційних питань.

ТОМАТ (відкритий ґрунт)



АЛТЕЙ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 90-98, ранній.

Форма (тип) плоду: циліндричний.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.

Маса плоду, г: 65-70. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: цілоплідне консервування та переробка на томатопродукти.

Врожайність, т/га: 70-76.

Стійкість до хвороб: польова стійкість до фітофторозу.

Особливості: ранньостиглий сорт з високою щільністю, транспортабельністю та лежкістю плодів.



АСТЕРОЇД

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 107-112, середньоранній.

Форма (тип) плоду: плескато-округлий.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна, облісненість – середня.

Маса плоду, г: 160-200, перші до 350. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: засолювання, переробка на томатопродукти.

Врожайність, т/га: 50-55.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: висока транспортабельність плодів, крупноплідність.



ГЕЙЗЕР

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 90-100, ранній.

Форма (тип) плоду: овальна.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.

Маса плоду, г: 80. **Забарвлення плоду:** яскраво-червоне.

Використання: консервування і переробка.

Врожайність, т/га: 55-60.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб, холодостійкий.

Особливості: ранньостиглість, транспортабельність, однорівність і інтенсивність забарвлення плодів, високий вміст розчинних сухих речовин (до 5,2 %).



ГОСПОДАР

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 110-115, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: округлий.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, середньоросла.

Маса плоду, г: 110-140. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: універсальне.

Врожайність, т/га: 60-80.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: м'ясисті плоди високої якості, високоврожайний.

ТОМАТ (відкритий ґрунт)



ДАМА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 112-118, пізньостиглий.

Форма (тип) плоду: циліндрична.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна, штамбова.

Маса плоду, г: 70-85. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: цілоплідне консервування та переробка на тоματοпродукти.

Врожайність, т/га: 70-75.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: щільні, м'ясисті плоди, мають високу транспортабельність та лежкість.



ЕЛЕОНОРА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 102-110, середньоранній.

Форма (тип) плоду: округлий.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.

Маса плоду, г: 80-90. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: цілоплідне консервування.

Врожайність, т/га: 75-80.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: висока щільність плодів, придатність до інтенсивних технологій вирощування.



ЗОЛОТИЙ ПОТОК

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 85-92, ранній.

Форма (тип) плоду: еліпсоподібні з носиком.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.

Маса плоду, г: 65-70. **Забарвлення плоду:** оранжеве.

Використання: цілоплідне консервування та переробка на тоματοпродукти.

Врожайність, т/га: 65-70.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: оранжевоплідний ранньостиглий сорт з високими смаковими якостями і високим вмістом β-каротину (до 1,2 мг/100 г), стійкий до перепаду температур.



ЗОРЕСЛАВ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 105-115, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: округлий.

Тип рослини (сила росту): детермінантна.

Маса плоду, г: 80. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Врожайність, т/га: 52-62.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб, холодостійкий.

Особливості: довго зберігає товарні якості на рослині, висока транспортабельність.

ТОМАТ (відкритий ґрунт)



ГРИШКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 87-92, ультраранній.

Форма (тип) плоду: овальна.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.

Маса плоду, г: 20-25. **Забарвлення плоду:** яскраво-червоне.

Використання: свіже споживання, консервування.

Врожайність, т/га: 50-55.

Стійкість до хвороб: польова стійкість до фітофторозу.

Особливості: дрібноплідний, ультраранній, дружнодосягаючий сорт з високою якістю плодів.



КАРАСЬ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 105-110, середньоранній.

Форма (тип) плоду: овальна та округло-овальна.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.

Маса плоду, г: 100-140. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: засолювання, переробка на томатопродукти.

Врожайність, т/га: 50-60.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: транспортабельність, універсального призначення.



КЛОНДАЙК

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 97-105, ранній.

Форма (тип) плоду: плескато-округлий.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна

Маса плоду, г: 200-350. **Забарвлення плоду:** оранжеве.

Використання: свіже споживання.

Врожайність, т/га: 50-55.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: оранжевоплідний томат з високими смаковими і дієтичними якостями та підвищеним вмістом β-каротину (до 1,5 мг/100 г).



ЛЮБИМИЙ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 107-112, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: плескато-округлий.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна.

Маса плоду, г: 150-250. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: свіже споживання, переробка на сік, соління.

Врожайність, т/га: 50-60.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: стійкий до перепаду температур, відмінні смакові якості.

ТОМАТ (відкритий ґрунт)



МАЛИНОВИЙ ДЗВІН

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 105-108, середньоранній.

Форма (тип) плоду: округлий.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.

Маса плоду, г: 75-80. **Забарвлення плоду:** рожеве.

Використання: цілоплідне консервування та переробка на томатопродукти.

Врожайність, т/га: 45-50.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: рожевоплідний сорт з високими смаковими якостями.



МАЛИНОВЕ ВІКАНТЕ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 106-111, середньоранній.

Форма (тип) плоду: плескато-округлий.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.

Маса плоду, г: 200-350. **Забарвлення плоду:** рожеве.

Використання: свіже споживання.

Врожайність, т/га: 60-70.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: поєднує високу товарність з високими смаковими якостями плодів, малинове забарвлення.



РОЖЕВИЙ ВЕЛЕТЕНЬ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 100-108, середньоранній.

Форма (тип) плоду: плескато-округлий.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна.

Маса плоду, г: 200-350. **Забарвлення плоду:** рожеве.

Використання: свіже споживання.

Врожайність, кг/м²: 15-20.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: крупноплідний сорт зі щільними плодами високих смакових якостей, придатний до вирощування у плівкових теплицях і у відкритому ґрунті у коловій культурі.



РОЖЕВЕ СЕРЦЕ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 112-121, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: серцеподібні.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна.

Маса плоду, г: 200-350. **Забарвлення плоду:** рожеве.

Використання: свіже споживання.

Врожайність, кг/м²: 14-17.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: крупноплідний сорт зі щільними плодами високих смакових якостей, придатний до вирощування у плівкових теплицях і у відкритому ґрунті у коловій культурі.

ТОМАТ (відкритий ґрунт)



ЧАЙКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 98-105, ранній.

Форма (тип) плоду: округлий.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, штамбова.

Маса плоду, г: 70-90. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: цілоплідне консервування та переробка на томатопродукти.

Врожайність, т/га: 65.

Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозу.

Особливості: привабливий зовнішній вигляд, формує якісну розсаду, толерантну до загущення, яка легко приживається.



САНДРА F₁

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 97-100, ранній.

Форма (тип) плоду: округло-овальна.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.

Маса плоду, г: 70-90. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: цілоплідне консервування та переробка на томатопродукти.

Врожайність, т/га: 80-100.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: ранньостиглий високоврожайний гібрид з високою щільністю і транспортабельністю плодів з високим вмістом сухих розчинних речовин (5,2 %).

ТОМАТ (закритий ґрунт)



РОСА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 110-115, середньостиглий.

Тип рослини (сила росту): індетермінантний.

Форма (тип) плоду: округла.

Маса плоду, г: 250-300. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: для споживання у свіжому вигляді.

Врожайність, кг/м²: 17-20.

Стійкість до хвороб і шкідників: стійкий до ураження бурою плямистістю, толерантний до ранньої сухої плямистості.

Особливості: крупноплідний дружнодистигаючий гібрид для плівкових теплиць.



УДАВЧИК

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 101-105, ранньостиглий.

Тип рослини (сила росту): індетермінантний.

Форма (тип) плоду: округла.

Маса плоду, г: 120-140. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: для споживання у свіжому вигляді.

Врожайність, кг/м²: 18-22.

Стійкість до хвороб і шкідників: стійкий до ураження бурою плямистістю, толерантний до ранньої сухої плямистості.

Особливості: ранньостиглий дружнодистигаючий гібрид для плівкових теплиць.



ЯРИНА F₁

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 110-115, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: плескато-округла.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна.

Маса плоду, г: 150-250. **Забарвлення плоду:** червоне.

Використання: свіже споживання.

Врожайність, кг/м²: 15-20.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до ранньої сухої плямистості та хвороб в'янення.

Особливості: крупноплідний транспортабельний сорт зі смачними інтенсивно забарвленими м'ясистими плодами.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ



ВАЛЮША

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 100-104, середньоранній.

Форма (тип) плоду: ширококонусоподібна.

Тип рослини (сила росту): компактна, середньоросла.

Забарвлення плоду: жовто-біле, при досяганні яскраво-червоне.

Довжина плоду, см: 12-14. **Товщина стінки плоду, мм:** 6-7.

Врожайність, т/га: 28-35. **Маса плоду, г:** 110-120.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Стійкість до хвороб: середньо стійкий до фузаріозного в'янення та вірусних хвороб.

Особливості: сорт з великими привабливими плодами.



ДРУЖОК

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 100-115, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: ширококонусоподібна з гострою верхівкою.

Тип рослини (сила росту): компактна.

Забарвлення плоду: зелене, при досяганні червоне.

Довжина плоду, см: 8-10. **Товщина стінки плоду, мм:** 6-7.

Врожайність, т/га: 45-50. **Маса плоду, г:** 100-110.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозного в'янення та бактеріальної плямистості.

Особливості: холодостійкий товстостінний сорт для плівкових теплиць і відкритого ґрунту.



ЗЛАГОДА F₁

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 94-105, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: конусоподібна.

Тип рослини (сила росту): компактна, середньоросла.

Забарвлення плоду: зелене, при досяганні червоне.

Довжина плоду, см: 11-13. **Товщина стінки плоду, мм:** 6-7.

Врожайність, т/га: 32-40. **Маса плоду, г:** 90-95.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозного в'янення та бактеріальної плямистості.

Особливості: високоврожайний гібрид з високою транспортабельністю.



ЛАДА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 82-90, ультраранній.

Форма (тип) плоду: усиченоконусоподібна.

Тип рослини (сила росту): компактна, напівштамбова.

Забарвлення плоду: жовто-зелене, яскраво-червоне.

Довжина плоду, см: 8-9. **Товщина стінки плоду, мм:** 6-8.

Врожайність, т/га: 28-30. **Маса плоду, г:** 90-95.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Стійкість до хвороб: стійкий до ВТМ та фузаріозного в'янення.

Особливості: гармонійний смак, товстостінні яскраві високотоварні плоди.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ



НАДІЯ

Компанія-оригізатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 100-115, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: видовженоконусоподібна.

Тип рослини (сила росту): розлога.

Забарвлення плоду: салатове, яскраво-червоне.

Довжина плоду, см: 10-12. **Товщина стінки плоду, мм:** 4-6.

Врожайність, т/га: 22-33. **Маса плоду, г:** 85-95.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозного в'янення та бактеріальної плямистості.

Особливості: холодостійкий урожайний невибагливий низькорослий сорт.



ПОЛТАВСЬКИЙ

Компанія-оригізатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 113-117, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: конусоподібна.

Тип рослини (сила росту): середньої висоти.

Забарвлення плоду: зелене, при достиганні червоне.

Довжина плоду, см: 10-11. **Товщина стінки плоду, мм:** 4-7.

Врожайність, т/га: 32-35. **Маса плоду, г:** 70-80.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Стійкість до хвороб: середньо стійкий до фузаріозного в'янення та бактеріальної плямистості.

Особливості: яскраво-червоні вирівняні плоди високих смакових якостей.



СНІГУР

Компанія-оригізатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 88-103, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: ширококонусоподібна.

Тип рослини (сила росту): компактна, середньоросла.

Забарвлення плоду: зелене, при достиганні червоне.

Довжина плоду, см: 10-12. **Товщина стінки плоду, мм:** 5-7.

Врожайність, т/га: 25-30. **Маса плоду, г:** 85-90.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Стійкість до хвороб: середньо стійкий до фузаріозного в'янення, надзвичайно стійкий до бактеріальної плямистості.

Особливості: високоврожайний холодостійкий товстостінний сорт з високою транспортабельністю.



ФЕЯ

Компанія-оригізатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 92-112, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: ширококонусоподібна.

Тип рослини (сила росту): середньоросла.

Забарвлення плоду: світло-жовте, яскраво-червоне.

Довжина плоду, см: 8-10. **Товщина стінки плоду, мм:** 5-6.

Врожайність, т/га: 30-36. **Маса плоду, г:** 80-90.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозного в'янення.

Особливості: стійкий до стресових умов середовища, зовнішній вигляд плодів привабливий.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ



СВІТОЗАР

Компанія-оригізатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 117-125, середньопізній.

Форма (тип) плоду: кубоподібна.

Тип рослини (сила росту): низька, компактна, штамбова.

Забарвлення плоду: жовто-зелене, яскраво-червоне.

Довжина плоду, см: 9-10. **Товщина стінки плоду, мм:** 6-9.

Врожайність, т/га: 36,5-42,0. **Маса плоду, г:** 120-130.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Стійкість до хвороб: стійкий до ВТМ.

Особливості: компактний кущ, товстостінні плоди привабливої форми високих смакових якостей.

ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ



ХАРКІВСЬКИЙ

Компанія-оригізатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: до технічної стиглості 104-134 дні, біологічної – 140-155, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: видовженоконусоподібна.

Тип рослини: напіврозлогий, висотою 45-63 см.

Забарвлення плоду: у технічній стиглості темно-зелений, у біологічній – яскраво-червоний.

Довжина плоду, см: 10-13. **Товщина стінки плоду, мм:** 2-3.

Маса плоду, г: 16-20.

Використання: як спецію у кулінарії.

Врожайність, т/га: 85-120, при зрошенні – 24-32.

Особливості: стійкий проти фузаріозного в'янення.

Достигання дружно, за перші два збори віддає 80-85 % урожаю.



НОВИНКА

ХАРУЗ

Компанія-оригізатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 92-94, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: видовженоконічна.

Тип рослини: напівштамбовий, висотою 65-75 см.

Забарвлення плоду: у технічній стиглості – темно-зелене, при досягненні яскраво-червоне.

Довжина плоду, см: 20-28. **Товщина стінки плоду, мм:** 1,2-2,5.

Маса плоду, г: 30-45.

Використання: як спецію у кулінарії.

Врожайність, т/га: 35.

Особливості: стійкий проти фузаріозного в'янення.

БАКЛАЖАН



БІЛА ЛІЛІЯ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 110-115, середньоранній.

Забарвлення плоду: біле.

М'якуш: яскраво-білий, щільний, без гіркоти.

Кущ: висота – 60-70 см. **Кількість плодів на рослині, шт.:** 6-8.

Маса плоду, г: 200-250 (у відкритому ґрунті).

Урожайність, т/га: у відкритому ґрунті 30-35, у захищеному – 50-60.

Використання: для споживання у переробленому вигляді та консервування.

Особливості: хороша транспортабельність, високі смакові якості, придатний до вирощування у відкритому та захищеному ґрунті, для короткострокового зберігання.



НОВИНКА

ЛІДЕР

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 105-110, ранньостиглий.

Забарвлення плоду: яскраво-бузкове.

М'якуш: яскраво-білий, щільний без гіркоти.

Кущ: 60-70 см.

Кількість плодів на рослині, шт.: 6-15.

Маса плоду, г: 200-250.

Урожайність, т/га: 35-40.

Використання: для споживання у переробленому вигляді та консервування.

Особливості: висока лежкість і транспортабельність, придатний до вирощування в захищеному та у відкритому ґрунті, жаростійкий, стійкий до фузаріозного в'янення.



ПРЕМ'ЄР

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 105-112, ранньостиглий.

М'якуш: яскраво-білий, щільний, без гіркоти.

Забарвлення плоду: темно-фіолетове.

Кущ: висота – 60-70 см. **Кількість плодів на рослині, шт.:** 6-8.

Маса плоду, г: 250-300 (у відкритому ґрунті).

Урожайність, т/га: у відкритому ґрунті 35-40, у захищеному – 50-70.

Використання: для споживання у переробленому вигляді та консервування.

Особливості: висока лежкість і транспортабельність, придатний для вирощування у відкритому та захищеному ґрунті, відрізняється високими технологічними і смаковими якостями.



НОВИНКА

САПФІР F₁

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 90-95, ранньостиглий.

Забарвлення плоду: темно-фіолетовий.

М'якуш: білий з зеленуватим відтінком, щільний, без гіркоти.

Кущ: висота – 60-70 см. **Кількість плодів на рослині, шт.:** 6-8.

Маса плоду, г: 180-190.

Урожайність: у відкритому ґрунті – 36 т/га, у плівкових теплицях – 11,9 кг/м².

Використання: для споживання у переробленому вигляді та консервування.

Особливості: добре формує врожай в несприятливих умовах навколишнього середовища.



АНЕТ F₁

Компанія-оригіна́тор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 51-57, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: циліндрична.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна, сильноросла.

Забарвлення плоду: зелене. **Довжина плоду, см:** 10-12.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Врожайність, кг/м²: у весняних теплицях - 15-18, у відкритому ґрунті до 42,8 т/га. **Товарність, %:** 90-93.

Стійкість до хвороб: стійкий до ураження кореневими гнилями і пероноспорозом.

Особливості: холодостійкий, жіночого типу цвітіння, для вирощування у відкритому та захищеному ґрунті.



ГЕЙМ

Компанія-оригіна́тор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 45-47, середньоранній.

Форма (тип) плоду: видовжено-овальна.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна.

Забарвлення плоду: інтенсивно зелене.

Довжина плоду, см: 10-11.

Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

Врожайність, т/га: 28-30.

Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу та бактеріозу.

Особливості: високі смакові якості свіжих та солоних плодів.



ДЖЕРЕЛО

Компанія-оригіна́тор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 40-44, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: веретеподібна.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна.

Забарвлення плоду: зелене.

Довжина плоду, см: 11-12.

Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

Врожайність, т/га: 30-35.

Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу та бактеріозу.

Особливості: жаростійкий, інтенсивного типу, високі засолювальні якості.



ЕВРИКА F₁

Компанія-оригіна́тор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 44-45, середньоранній.

Форма (тип) плоду: циліндрична.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна.

Забарвлення плоду: зелене.

Довжина плоду, см: 10-12.

Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

Врожайність, т/га: 35-40.

Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу та бактеріозу.

Особливості: висока якість солоних та консервованих плодів, висока адаптивна здатність.



НОВИНКА

КАСАТІК F₁

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 41-42, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: циліндрична.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна.

Забарвлення плоду: зелене.

Довжина плоду, см: 11-12.

Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

Врожайність, т/га: 35-40.

Стійкість до хвороб: Стійкий до пероноспорозу та бактеріозу.

Особливості: віддача урожаю за першу декаду 72 %, високі засолювальні якості.



КСАНА F₁

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 40-44, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: циліндрична.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна, сильноросла.

Забарвлення плоду: зелене. **Довжина плоду, см:** 11-13.

Використання: для споживання у свіжому вигляді, консервування та соління.

Врожайність, кг/м²: у весняних теплицях – 23, у відкритому ґрунті до 30-35 т/га. **Товарність, %:** 93.

Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу і кореневої гнилі.

Особливості: холодостійкий, жіночого типу цвітіння, для вирощування у плівкових теплицях.



САМОРОДОК F₁

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 42-44, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: циліндрична.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна, сильноросла.

Забарвлення плоду: світло-зелене. **Довжина плоду, см:** 10-14.

Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

Врожайність, т/га: 35.

Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу і бактеріозу.

Особливості: переважно жіночого типу цвітіння, товарність плодів 94 %, висока транспортабельність, протягом 5-7 діб зберігають товарність.



СЛОБОЖАНСЬКИЙ F₁

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 42-44, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: циліндрична.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна, сильноросла.

Забарвлення плоду: світло-зелене. **Довжина плоду, см:** 10-12.

Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

Врожайність: у захищеному ґрунті – 25 кг/м², у відкритому – 51,4 т/га.

Стійкість до хвороб: стійкий до борошнистої роси і пероноспорозу.

Особливості: переважно жіночого типу цвітіння, товарність плодів 96 %, для вирощування у плівкових теплицях та відкритому ґрунті.

ОГІРОК



СМАК F₁

Компанія-оригінатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 45-48, середньоранній.

Форма (тип) плоду: циліндрична.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна.

Забарвлення плоду: темно-зелене. **Довжина плоду, см:** 12-16.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Врожайність: у відкритому ґрунті 35-40 т/га, у весняних теплицях 10 кг/м²;

Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу, борошнистої роси та бактеріозу.

Особливості: товарність плодів 91 %, довго не жовтіють, тривалість зберігання зеленця – до 10 діб, плоди транспортабельні.



ЛІРИК F₁

Компанія-оригінатор: Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 38-40, ранньостиглий

Форма (тип) плоду: циліндрична.

Тип рослини (сила росту): індетермінантна, сильноросла.

Забарвлення плоду: зелене.

Довжина плоду, см: 8-10.

Використання: для споживання у свіжому вигляді, консервування та соління.

Врожайність, кг/м²: у весняних теплицях – 14,6-16,9.

Товарність, %: 88-96.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до кореневої гнилі.

Особливості: партенокарпічний скоростиглий гібрид, жіночого типу цвітіння, для вирощування у плівкових теплицях.

КАБАЧОК



ЧАКЛУН

Компанія-оригінатор: Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 42-45, плодоношення – 63, ранньостиглий.

Маса плоду, г: 350. **Урожайність, т/га:** 50-60.

Форма плоду: циліндричний.

Забарвлення плоду: біле, в біологічній стиглості – кремове.

Довжина плоду, см: 15-20. **Діаметр плоду, см:** 5-7.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до ураження борошнистою росю.

Використання: у кулінарії і для переробки.

Особливості: за перший період плодоношення віддає урожаю 15-20 т/га, транспортабельний, лежкість – 90 % через 10 діб, характеризується високим навантаженням рослин зав'яззю, дружною віддачею врожаю і кущовою формою рослини.

ПАТИСОН



ПЕРЛИНКА

Компанія-оригіатор: Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 42-45, плодоношення – 63, ранньостиглий.

Маса плоду, г: 350. **Урожайність, т/га:** 50-60.

Форма плоду: циліндричний.

Забарвлення плоду: біле, в біологічній стиглості – кремове.

Довжина плоду, см: 15-20. **Діаметр плоду, см:** 5-7.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до ураження борошнистою росою.

Використання: у кулінарії і для переробки.

Особливості: за перший період плодоношення віддача урожаю 15-20 т/га, транспортабельний, лежкість – 90 % через 10 діб, характеризується високим навантаженням рослин зав'яззю, дружною віддачею врожаю і кущовою формою рослини.

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА



БІЛОСНІЖКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 155-175.

Форма головки: округло-плеската або округла, щільна.

Маса головки, кг: 2,3-4,9.

Урожайність, т/га: 60-80.

Використання: для зимового зберігання і квашення.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до слизового і судинного бактеріозів, фузаріозного в'янення.

Особливості: висока товарність, транспортабельний, стійкий до розтріскування, дружно досягає, висока якість квашеної продукції.



ЛАЗУРНА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 164-170.

Форма головки: плескато-округла, дуже щільна.

Маса головки, кг: 3,5-4,0.

Урожайність, т/га: 60-94,4.

Використання: універсального призначення.

Стійкість до хвороб: стійкий.

Особливості: високі технологічні та біохімічні показники, лежкий, транспортабельний, відмінна якість квашеної продукції.

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА



ЛЕСЯ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: до технічної стиглості – 155-165.

Форма головки: плескато-округла, щільна.

Маса головки, кг: 3,5-4,0.

Урожайність, т/га: 75-90.

Використання: для тривалого зберігання та квашення.

Стійкість до хвороб: стійкий до хвороб.

Особливості: висока товарність, транспортабельність, лежкість, стійкий до розтріскування.



УКРАЇНСЬКА ОСІНЬ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 160-175.

Форма головки: округло-плеската, щільна.

Маса головки, кг: 1,9-4,2.

Урожайність, т/га: потенційна – до 112.

Використання: для споживання у свіжому та переробленому вигляді, тривалого зберігання.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до фузаріозного в'янення та судинного бактеріозу.

Особливості: транспортабельний, дружне досягання та висока морфологічна вирівняність товарних головок, лежкий.



ХАРКІВСЬКА ЗИМОВА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 160-180.

Форма головки: округло-плеската, щільна.

Маса головки, кг: 1,9-3,5.

Урожайність, т/га: 70-86.

Використання: для тривалого зберігання і квашення.

Стійкість до хвороб: стійкий до ураження крапчастим некрозом, розтріскування, відносно жаро- і морозостійкий.

Особливості: висока лежкість головок і добра транспортабельність.



ХАРКІВСЬКА СУПЕР

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 160-175.

Форма головки: округло-плеската або округла, дуже щільна.

Маса головки, кг: 1,9-3,5.

Урожайність, т/га: 50-56.

Використання: для зберігання і квашення.

Стійкість до хвороб: відносно жаро- і посухостійкий.

Особливості: відмічається підвищеним вмістом сухої речовини – 8-11 %, стійкий до розтріскування, бренд лежкості.

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА



ЯНА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 160-170.

Форма головки: округло-плеската, округла, дуже щільна.

Маса головки, кг: 2,5-3,0.

Урожайність, т/га: 75-80.

Використання: для споживання у свіжому вигляді та квашення.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до фузаріозного в'янення і судинного бактеріозу.

Особливості: лежкий, високі показники якості свіжої та квашеної продукції, висока однорідність та дружність достигання.



ЯРОСЛАВНА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 160-175.

Форма головки: округло-плеската, дуже щільна.

Маса головки, кг: 3,4-4,2.


Урожайність, т/га: 70-86, потенційна – до 106.

Використання: для свіжого споживання і квашення.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до фузаріозного в'янення та судинного бактеріозу.

Особливості: висока лежкість, товарність.

КАПУСТА ЧЕРВОНОГОЛОВА



ПАЛЕТА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 140-150.

Форма головки: округла.

Маса головки, кг: 1,5-1,8.

Урожайність, т/га: 35-47.

Використання: для тривалого зберігання і споживання у свіжому та переробленому вигляді.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до фузаріозного в'янення.

Особливості: високі показники якості лікувально-дієтичної продукції.

КАПУСТА САВОЙСЬКА



РОЗАЛІ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 130-150.

Форма головки: плескато-округла.

Маса головки, кг: 2,0-2,5.

Урожайність, т/га: 36-42.

Використання: для свіжого споживання.

Стійкість до хвороб: стійкий.

Особливості: морозостійкий, лежкий, високі біохімічні показники, якісна дієтична продукція в зимово-весняний період, відмічається високим вмістом вітаміну С – 39,1 мг/100 г.

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА



АМФОРА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напрямок використання: універсальний, напівгострий.

Вегетаційний період, діб: 100-115.

Урожайність, т/га: 35-40. **Лежкість:** 6-7 місяців.

Форма цибулин: оберненояйцеподібна.

Колір покривних лусок: темно-малиновий.

Колір соковитих лусок: білий зі світло-фіолетовим епідермісом.

Маса цибулин, г: 100-130. **Вміст сухої речовини, %:** 12-13.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: високі смакові якості.



НОВИНКА

БЕЛЛА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напрямок використання: універсальний, гострий.

Вегетаційний період, діб: 102-104.

Урожайність, т/га: 30-40. **Лежкість:** 7-8 місяців.

Форма цибулин: округла та округло-плеската.

Колір покривних лусок: жовті з коричневим відтінком.

Колір соковитих лусок: зеленуватий.

Маса цибулин, г: 80-100.

Вміст сухої речовини, %: 14,8.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: тривалий термін зберігання.

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА



ВАРЯГ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напрям використання: універсальний, гострий.

Вегетаційний період, діб: 106-110.

Урожайність, т/га: 30-35. **Лежкість:** 7-8 місяців.

Форма цибулин: округла та округло-плеската.

Колір покривних лусок: світло-коричневий.

Колір соковитих лусок: білий з жовтуватим відтінком.

Маса цибулин, г: 80-130. **Вміст сухої речовини, %:** 12,5-13.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: висока щільність цибулин і лежкість.



ВЕСЕЛКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напрям використання: салатний, напівгострий.

Вегетаційний період, діб: 92-115.

Урожайність, т/га: 30-40. **Лежкість:** 6-7 місяців.

Форма цибулин: округла та округло-плеската.

Колір покривних лусок: фіолетово-червоний.

Колір соковитих лусок: білі з фіолетовим епідермісом.

Маса цибулин, г: 100-160. **Вміст сухої речовини, %:** 12-13.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: дружне дозрівання і висока збереженість цибулин.



ГЛОБУС

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напрям використання: універсальний, напівгострий.

Вегетаційний період, діб: 100-115.

Урожайність, т/га: 40-60. **Лежкість:** 6-7 місяців.

Форма цибулин: округла та округло-овальна.

Колір покривних лусок: світло-коричневий.

Колір соковитих лусок: білий з салатним відтінком.

Маса цибулин, г: 150-200. **Вміст сухої речовини, %:** 10-11.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: великі соковиті цибулини, висока потенційна урожайність.



ЛЮБЧИК

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напрям використання: універсальний, гострий.

Вегетаційний період, діб: 106-110.

Урожайність, т/га: 40-50. **Лежкість:** 7-8 місяців.

Форма цибулин: еліптична (сигароподібна).

Колір покривних лусок: золотисто-жовтий.

Колір соковитих лусок: білий з прозеленню у верхній частині.

Маса цибулин, г: 85-190. **Вміст сухої речовини, %:** 13-15.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: ½ цибулини знаходиться над поверхнею ґрунту, цибулина щільна, тонкі соковиті луски, зручна в кулінарній обробці, висока збереженість.

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА



МАВКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напрям використання: салатний, напівгострий.

Веgetаційний період, діб: 102-114, середньостиглий.

Урожайність, т/га: 30-37. **Лежкість:** 6-7 місяців.

Форма цибулин: плеската та округло-плеската.

Колір покривних лусок: фіолетово-червоний.

Колір соковитих лусок: білі з фіолетовим епідермісом.

Маса цибулин, г: 100-150. **Вміст сухої речовини, %:** 12-13.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: висока збереженість цибулин.



ТКАЧЕНКІВСЬКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напрям використання: універсальний, гострий.

Веgetаційний період, діб: 96-108.

Урожайність, т/га: 35-54. **Лежкість:** 7-8 місяців.

Форма цибулин: округла та округло-овальна.

Колір покривних лусок: жовто-коричневий.

Колір соковитих лусок: білий з прозеленню у верхній частині.

Маса цибулин, г: 110-150. **Вміст сухої речовини, %:** 12,5-13,5.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: висока врожайність та збереженість цибулин.

ЦИБУЛЯ БАТУН



П'ЄРО

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: від повних сходів до технічної стиглості 102-142,

від початку відростання пера до збирання 35-45.

Маса рослини, г: 200-300.

Загальний урожай з лисками, кг/м²: 1,0-1,8.

Форма цибулини: видовжена, редукована, масивна.

Смак: напівгострий.

Листки: ніжні, соковиті, довго не грубіють.

Забарвлення зовнішніх лусок: світло-жовте, соковитих – біле.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.

Використання: салатного призначення.

Особливості: ранньостиглий, багаторічний.

ЦИБУЛЯ ШАЛОТ



ЛІРА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 72-74.

Маса цибулини, г: 30-50.

Урожайність цибулин, т/га: 15-16. **Лежкість, %:** 92.

Урожайність зеленого пера, т/га: 28.

Форма цибулини: еліптична.

Смак: гострий.

Використання: універсального призначення.

Особливості: відзначається дружністю відростання зелених листків.

ЧАСНИК ОЗИМИЙ



ДЮШЕС

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Забарвлення покривних лусок: біле з рожевим відтінком.

Кількість зубків у цибулині: 5-6.

Маса цибулини, г: 40-60.

Маса повітряних цибулин, г: 100 шт. – 80-180.

Урожайність цибулин, т/га: 9,2.

Розмноження: зубки, повітряні цибулини, однозубки.

Використання: універсального призначення.

Особливості: крупні повітряні цибулини, які при сівбі під зиму утворюють однозубки масою 5-8 г і близько 5% цибулин поділені на зубки, стрілкующий.



МЕРЕФ'ЯНСЬКИЙ БІЛИЙ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Забарвлення покривних лусок: біле.

Кількість зубків у цибулині: 4-5.

Маса цибулини, г: 60-70.

Маса повітряних цибулин, г: 100 шт. – 45,6.

Урожайність цибулин, т/га: 9.

Розмноження: зубки, повітряні цибулини, однозубки.

Використання: універсального призначення.

Особливості: цінують за багатий вміст поживних речовин, особливо інсуліну. За вмістом цукрів перевищує продукцію всіх видів овочевих рослин, озимий, стрілкующий, з доброю зимостійкістю.

БУРЯК СТОЛОВИЙ



БАГРЯНИЙ

Компанія-оригізатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: до технічної стиглості – 133-136, пізньостиглий. **Використання:** універсальне.

Коренеплід: діаметр, см: 10. **Маса, г:** 290-450.

Форма коренеплоду: видовженоконічний з сильним збігом донизу.

М'якуш: яскраво-темно-бордовий, серцевина без кілець.

Урожайність, т/га: 35-47.

Стійкість до хвороб: стійкий при тривалому зберіганні.

Особливості: високі смакові якості.



БОРДО ХАРКІВСЬКИЙ

Компанія-оригізатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: до технічної стиглості – 115-133, середньостиглий. **Використання:** універсальне.

Коренеплід: діаметр, см: 12-15. **Маса, г:** 230-300.

Форма коренеплоду: кулястий.

М'якуш: темно-червоний, з бордовим відтінком, серцевина кругла, без кілець.

Урожайність, т/га: 38-43.

Стійкість до хвороб: стійкий до гнилей.

Особливості: добре зберігається (90-95 %).



ВІТАЛ

Компанія-оригізатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: до технічної стиглості – 100-110, середньостиглий. **Використання:** універсальне.

Коренеплід: діаметр, см: 5-7. **Маса, г:** 310-350.

Форма коренеплоду: циліндричний.

М'якуш: соковитий, темно-червоний, зі слабкою кільцюватістю.

Урожайність, т/га: 60-80.

Стійкість до хвороб: стійкий до гнилей.

Особливості: з підвищеним вмістом бетаніну (460-570 мг/100 г).

БУРЯК СТОЛОВИЙ



ДІЙ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: до пучкової стиглості 50-60 діб, до технічної – 92-110, середньоранній. **Використання:** універсальне.

Коренеплід: діаметр, см: 8-10. **Маса, г:** 380-440.

Форма коренеплоду: овальноокруглий зі збігом донизу.

М'якуш: темно-червоний з фіолетовим відтінком і більш світлими рожево-червоними кільцями, ніжний.

Урожайність, т/га: 53-56.

Стійкість до хвороб: стійкий до гнилей.

Особливості: придатний для механізованого збирання, здатний формувати урожай у фазі технічної стиглості двічі на рік.



новинка

ЮЛІС

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: до технічної стиглості – 95-100, середньостиглий.

Використання: універсальне.

Коренеплід: діаметр, см: 8-10. **Маса, г:** 220-230.

Форма коренеплоду: округлий.

М'якуш: червоний з бордовим відтінком з ледь помітними кільцями, ніжний, соковитий.

Урожайність, т/га: 57-59.

Стійкість до хвороб: стійкий до гнилей.

Особливості: перевищує вихідну форму за вмістом бетаніну на 154,5 мг/100 г, стійкий до стрілкування.

МОРКВА



НАНТСЬКА ХАРКІВСЬКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: технічна стиглість – 110, середньостигла.

Призначення: тривале зберігання та переробка.

Коренеплід: довжина, см: 14; діаметр, см: 3.

Форма коренеплоду: циліндричний.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,8-1,0.

Урожайність, т/га: 55-65.

Стійкість до хвороб: середня стійкість до хвороб.

Особливості: висока лежкість, високі смакові якості.



ОЛЕНКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: до пучкової стиглості – 50, технічної – 70, ранньостигла.

Призначення: для раннього споживання.

Коренеплід: довжина, см: 9; діаметр, см: 5.

Форма коренеплоду: зрізаноконічний.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-0,8.

Урожайність, т/га: 55-75.

Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до хвороб.

Особливості: дружно віддає врожай у період пучкової стиглості; легко висмикується з ґрунту; стабільна врожайність при різних погодних умовах; висока лежкість; високі смакові якості.



ЯСКРАВА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: технічна стиглість – 90, середньостигла.

Призначення: раннє споживання, зберігання та переробка.

Коренеплід: довжина, см: 14; діаметр, см: 3,5.

Форма коренеплоду: циліндричний.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,8-1,0.

Урожайність, т/га: 65-75.

Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до хвороб.

Особливості: підвищений вміст каротину (до 24 мг/100 г), високі смакові якості, висока лежкість.

РЕДИСКА



БАЗИС

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Висівання насіння (місяць): не залежно від сезону.

Збір урожаю (місяць): залежно від дати висівання.

Достигання, діб: 22-27, середньостигла.

Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.

Форма коренеплоду: овально-округлий.

Колір коренеплоду: рожево-червоний з білим кінчиком.

Маса коренеплоду, г: 25-30.

Норма висівання насіння, шт./м²: 250-300.



БОГИНЯ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Висівання насіння (місяць): не залежно від сезону.

Збір врожаю (місяць): залежно від дати висівання.

Достигання, діб: 16-18, ранньостигла.

Стійкість до відтермінування збору врожаю: хороша.

Форма коренеплоду: циліндричний.

Колір коренеплоду: рожево-червоний.

Маса коренеплоду, г: 20-30.

Норма висівання насіння, шт./м²: 350-450.



МЕРЕФ'ЯНОЧКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Висів насіння (місяць): не залежно від сезону.

Збір врожаю (місяць): залежно від дати висівання.

Достигання, діб: 22-25, ранньостигла.

Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.

Форма коренеплоду: овальний.

Колір коренеплоду: червоний.

Маса коренеплоду, г: 30-34.

Норма висівання насіння, шт./м²: 350-400.



КСЕНІЯ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Висів насіння (місяць): не залежно від сезону.

Збір врожаю (місяць): залежно від дати висівання.

Достигання, діб: 27-30, середньостигла.

Стійкість до відтермінування збору врожаю: підтримує тургор, не стає м'яким.

Форма коренеплоду: видовжено-овальний.

Колір коренеплоду: яскраво-червоний.

Маса коренеплоду, г: 18-24.

Норма висівання насіння, шт./м²: 300-400.

РЕДИСКА



РУБІН

Компанія-оригіатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висів насіння (місяць): не залежно від сезону.
Збір врожаю (місяць): залежно від дати висівання.
Достигання, діб: 22-24, ранньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.
Форма коренеплоду: овально-округлий.
Колір коренеплоду: рожево-червоний.
Маса коренеплоду, г: 11-28.
Норма висівання насіння, шт./м²: 350-450.

РЕДЬКА ЛОБО



ТРОЯНДОВА

Компанія-оригіатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висів насіння (місяць): липень.
Збір врожаю (місяць): жовтень – початок листопада.
Достигання, діб: 80-82, середньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.
Форма коренеплоду: округла.
Колір коренеплоду: рожево-червоний.
Маса коренеплоду, г: 350-690.
Норма висівання насіння, шт./м²: 250-350.

РЕДЬКА ЛОБО



ЛЕБІДКА

Компанія-оригіатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висів насіння (місяць): липень.
Збір врожаю (місяць): жовтень – початок листопада.
Достигання, діб: 86-91, середньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.
Форма коренеплоду: овальна.
Колір коренеплоду: білий.
Маса коренеплоду, г: 380-600.
Норма висівання насіння, шт./м²: 200-300.



МАРУШКА

Компанія-оригіатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висів насіння (місяць): липень.
Збір врожаю (місяць): жовтень – початок листопада.
Достигання, діб: 75, ранньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.
Форма коренеплоду: округла.
Колір коренеплоду: білий.
Маса коренеплоду, г: 275-400.
Норма висівання насіння, шт./м²: 250-350.

ПАСТЕРНАК



ПЕТРИК

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від посіву до технічної стиглості – 130.

Призначення: як спеція у свіжому і переробленому вигляді.

Коренеплід: довжина, см: 25-30 см; діаметр, см: 5-6 см.

Форма коренеплоду: конічний з поступовим збігом.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-0,8.

Урожайність коренеплодів, т/га: 55-70.

Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до хвороб.

Лежкість коренеплодів, %: 89.

Особливості: стійкий проти осипання насіння, стабільна врожайність при різних погодних умовах; високий вміст пектину.



ЖИВЧИК

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від масових сходів до технічної стиглості – 90-110.

Призначення: як спеція у свіжому і переробленому вигляді.

Коренеплід: довжина, см: 18-20 см.

Форма коренеплоду: округло-сплюснутий.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-0,8.

Урожайність коренеплодів, т/га: 60-70.

Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до хвороб.

Лежкість коренеплодів, %: 94.

Особливості: легко висмикується з ґрунту, придатний для важких ґрунтів.

ПЕТРУШКА



БІЛЯВКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від посіву до збирання зеленої маси – 52-62, технічної – 115.

Призначення: для конвеєрного вирощування, салатного, консервного, лікувального, як спеція.

Коренеплід: довжина, см: 21-26 см; діаметр, см: 4-5.

Форма коренеплоду: конічний зі збігом, має випуклу голівку.


Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-0,8.

Урожайність коренеплодів, т/га: 35-37.

Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до хвороб.

Лежкість коренеплодів, %: 92.

Особливості: високий вміст вітаміну С, коренеплоди витримують зимування у ґрунті.



ХАРКІВ'ЯНКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від посіву до збирання зеленої маси – 75, технічної – 120.

Призначення: салатного, консервного, парфумерного, лікувального, як спеція.

Коренеплід: довжина, см: 22-30 см; діаметр, см: 3-4.

Форма коренеплоду: конічний з сильним збігом.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-0,8.

Урожайність коренеплодів, т/га: 31-35.

Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до хвороб.

Особливості: дружно віддає врожай у період пучкової стиглості зеленої маси, стійкий проти осипання насіння, стабільна врожайність при різних погодних умовах, високий вміст вітаміну С.

САЛАТ ЛИСТКОВИЙ



ВЕЛЬМОЖА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 25.

Призначення: для свіжого споживання.

Загальна врожайність зелені, т/га: 18-19.

Маса, г: 145-165.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 2,5.

Вміст: сухої речовини, %: 8; загального цукру, %: 2,1; вітаміну С, мг/100 г: 34,1.

Особливості: дружнодостигаючий, врожайний, холодостійкий, високовітамінний.



НОВИНКА

ГУСАР

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 18-20.

Призначення: для свіжого споживання.

Загальна врожайність зелені, т/га: 9,8-14,5.

Маса, г: 100-110.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 2,5.

Вміст: сухої речовини, %: 9; загального цукру, %: 1; вітаміну С, мг/100 г: 44,3.

Особливості: дружнодостигаючий, врожайний, посухостійкий.



НОВИНКА

МЕРЕФ'ЯНСЬКИЙ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 17-20.

Призначення: для свіжого споживання.

Загальна врожайність зелені, т/га: 9,8.

Маса, г: 150-174.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 2,5.

Вміст: сухої речовини, %: 5,3; загального цукру, %: 0,8; вітаміну С, мг/100 г: 26,1.

Особливості: стійкість проти стеблуння, здатність формувати товарні рослини в умовах посухи і високих температур у відкритому ґрунті.



НОВИНКА

СЛОБОЖАНСЬКИЙ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 17-19.

Призначення: для свіжого споживання.

Загальна врожайність зелені, т/га: 9,3.

Маса, г: 153-185.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 2,5.

Вміст: сухої речовини, %: 6,4; загального цукру, %: 0,8; вітаміну С, мг/100 г: 35,9.

Особливості: стійкість проти стеблуння, здатність формувати товарні рослини в умовах посухи і високих температур у відкритому ґрунті.

КРІП ЗАПАШНИЙ



ХАРКІВСЬКИЙ 85

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від масових сходів до стеблуння – 30-44, цвітіння – 51-71, утворення насіння – 89-105.

Призначення: універсальне.

Розетка: розлога, 6-10 крупних листків; висота, см: 29-33.

Черешок: довжина, см: 5-6.

Насіннєвий куш: висота, см: 108-132.

Урожайність, т/га: розетки листків – 10,5-36,2; в технічній стиглості – 21,6-53,2; насіння – 0,1-1,4.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: високоароматичний, зберігається у закритому ґрунті.

ШПИНАТ ГОРОДНІЙ



ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості 21-22.

Призначення: для свіжого споживання.

Загальна врожайність зелені, т/га: 21,2.

Маса, г: 139,6.

Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-1,0.

Вміст: сухої речовини, %: 15,3; загального цукру, %: 1,92; вітаміну С, мг/100 г: 84,02; нітратів, мг/кг: 290.

Особливості: стійкий до стеблуння, придатний до загущених посівів, для вирощування в усіх зонах України у відкритому і захищеному ґрунті.

КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА



ГОТИКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від масових сходів до біологічної стиглості зерна – 90-95. **Призначення:** у кулінарії.

Висота рослини: 45-50 см.

Зерно: довжина – 1,1-1,3 см, ширина – 0,8-0,9 см.

Зерно колір: світло зелений

Урожайність зерна, т/га: 1,9-2,3. **Кількість в бобі, шт.:** 5-6.

Маса зерна (1000 шт.), г: 350-470.

Вміст у насінні: загального цукру – 5,90 %, крохмалю – 44 %, білка – 21 %.

Особливості: середньостиглий, зернового напрямку споживання.



ДАР

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від масових сходів до біологічної стиглості зерна – 75-80. **Призначення:** у кулінарії.

Висота рослини: 28-35 см.

Зерно: довжина – 1,2-1,3 см, ширина – 0,5-0,6 см.

Зерно колір: світло коричневий.

Боби: напівцукрові, довжина – 11-12 см, ширина – 0,7-0,8 см.

Урожайність зерна, т/га: 1,2-1,3. **Кількість в бобі, шт.:** 5-6.

Маса зерна (1000 шт.), г: 230-300.

Вміст у технічно стиглих зелених бобах: сухої речовини – 9,0 %, загального цукру – 2,21 %, аскорбінової кислоти – 22,3 мг/100 г.

Особливості: скоростиглий, жовте забарвлення технічно стиглого бобу, овочевого напрямку споживання.

КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА



ШАХИНЯ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Достигання, діб: від масових сходів до біологічної стиглості зерна – 75-80. **Призначення:** у кулінарії.

Висота рослини: 44-50 см.

Зерно: довжина – 1,0-1,2 см, ширина – 0,2-0,3 см.

Зерно колір: білий. **Боби:** довжина – 12-14 см, ширина – 0,9-1,3 см.

Урожайність зерна, т/га: 2,2. **Кількість в бобі, шт.:** 5-6.

Маса зерна (1000 шт.), г: 280-350.

Вміст у технічно стиглих зелених бобах: сухої речовини – 8,5 %, загального цукру – 2,24 %, аскорбінової кислоти – 20,12 мг/100 г.

Особливості: скоростиглий, універсального напрямку споживання (овочевого і зернового).

ГАРБУЗ



МОЗОЛІЇВСЬКИЙ 15

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 118-120, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 4-8.

Урожайність, т/га: 20,0-40,0.

Форма плоду: овальний.

Забарвлення плоду: нестиглих плодів – темно-зелене, стиглих – жовте.

Візерунок кори: широкі поздовжні розірвані у вигляді плям смуги, у нестиглих плодів – темно-зелені, у стиглих – оранжеві.

Забарвлення м'якуша: апельсиновий.

Стійкість до хвороб: порівняно стійкий до хвороб.

Використання: універсальне.

Особливості: смакові якості високі, вміст сухої речовини 8-12 %, загального цукру 7-8 %, каротину 2,7-3,4 мг%, транспортабельність і лежкість середні.

ДИНЯ



КРИНИЧАНКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 70, середньостигла.

Маса плоду, кг: 2,0-2,4.

Урожайність, т/га: 37,0-40,0.

Форма плоду: овальний.

Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, іноді злегка сегментована.

М'якуш: середній, білий або блідо-кремовий, із зеленкуватим відтінком біля кори, ніжнозернистий, солодкий.

Стійкість до хвороб: досить стійкий.

Використання: універсальне.

Особливості: дружно віддає врожай, для вирощування у Степовій і Лісостеповій зонах.

КАВУН



МАКС ПЛЮС

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 80-85, середньоранній.

Маса плоду, кг: 3,1-4,0. **Форма плоду:** округло овальна.

Забарвлення плоду: темно зелене з сизим нальотом.

Візерунок: відсутній.

Забарвлення м'якуша: рожевий.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу, фузаріозного в'янення, борошнистої роси.

Особливості: холодостійкий, смакові якості відмінні, придатний до транспортування і довготривалого (понад 60 діб) зберігання, чуйний до високої технології.



ОГОНЬОК

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 70-79, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 1,6-6. **Форма плоду:** куляста.

Забарвлення плоду: темно-зелене. **Візерунок:** відсутній.

Забарвлення м'якуша: карміново-червоний.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до фузаріозного в'янення.

Особливості: холодостійкий, стійкий проти дефіциту освітлення, придатний для одноразового збирання, для вирощування у відкритому і захищеному ґрунті.



КАЗКА F₁

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 65-69, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 2,8-3,5. **Форма плоду:** куляста.

Забарвлення плоду: світло зелене.

Візерунок: зелені широкі розмиті смуги.

Забарвлення м'якуша: рожево-червоний.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу, фузаріозного в'янення, борошнистої роси.

Особливості: товарність висока 90-97 %, смакові якості відмінні, придатний до транспортування і середньострокового (понад 30 діб) зберігання.



СОНЯЧНЕ СЯЙВО

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 70-75, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 2,8-3,1. **Форма плоду:** куляста.

Забарвлення плоду: біле.


Візерунок: ледь помітні сегменти світлого відтінку та мармуровість.

Забарвлення м'якуша: золотистий.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу, фузаріозного в'янення, борошнистої роси.

Особливості: м'якуш жовтого кольору, не містить пігменту лікопіну, для вирощування у відкритому та захищеному ґрунті.

КАВУН



ЧОРНОГОРЕЦЬ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 80, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 2,5-3,0. **Форма плоду:** куляста.

Забарвлення плоду: чорно-зелене.

Візерунок: злегка помітні чорно-зелені смуги з синім нальотом.

Забарвлення м'якуша: злегка помітні чорно-зелені смуги з синім нальотом.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу, фузаріозного в'янення, борошнистої роси.

Особливості: засолювальний, стійкий проти посухи, тривалого похолодання та різких добових коливань температури.



ШАРМ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 65-79, ранньостиглий.


Маса плоду, кг: 2,8-3,5. **Форма плоду:** куляста.

Забарвлення плоду: світло зелене. **Візерунок:** зелені широкі розмиті смуги.

Забарвлення м'якуша: шарлаховий.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу, фузаріозного в'янення, борошнистої роси.

Особливості: холодостійкий, смакові якості відмінні, придатний до транспортування і середньострокового (понад 20 діб) зберігання.



ШИРОНІНСЬКИЙ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Термін дозрівання, діб: 80-84, середньоранній.

Маса плоду, кг: 2,5-3,0. **Форма плоду:** куляста.

Забарвлення плоду: біле зі світло-салатним відтінком.

Візерунок: середнього розміру салатні смуги зі слабким восковим нальотом.

Забарвлення м'якуша: рожево-малиновий.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу.

Особливості: засолювальний, транспортабельний, лежкий, придатний для механізованого збирання, відносно стійкий проти посухи.

Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва НААН

КАВУН



АРСЕНАЛ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич З.Д., Сидорка І.В., Полівода Л.І., Колесник І.І.

Термін дозрівання, діб: 95–100, середньопізній.

Маса плоду, кг: 2,5–3,7. **Форма плоду:** округла.

Урожайність, т/га: 32,0–37,0.

Забарвлення плоду: зелене. **Візерунок:** темно-зелені середні шипуваті смуги.

Забарвлення м'якуша: рожевий. **Хімічний склад**

м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,0%, загального цукру – 6,5%, вітаміну С – 6,3 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: висока транспортабельність (плоди не розтріскуються); стійкий проти посухи; високопридатний для засолювання; високі смакові якості (4,6–4,8 бали).



ВЕЛЕС

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сидорка І.В., Сидорка В.О., Заверталюк В.Ф.,

Полівода Л.І., Зверєва А.П.

Термін дозрівання, діб: 68–70, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 3,0–3,2. **Форма плоду:** округла.

Урожайність, т/га: 28–32.

Забарвлення плоду: темно-зелене. **Візерунок:** чорні вузькі смуги.

Забарвлення м'якуша: рожевий. **Хімічний склад**

м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,0%, загального цукру – 7,9%, вітаміну С – 9,0 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: скоростиглий; дружна віддача урожаю (період від першого до останнього збирання 6 діб); високі смакові якості плодів (4,6–4,7 бали).



ЗОРЯНИЙ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич З.Д., Сич І.М.

Термін дозрівання, діб: 80–85, середньоранній.

Маса плоду, кг: 3,0–4,0. **Форма плоду:** округла.

Урожайність, т/га: 35,0–40,0.

Забарвлення плоду: світло-зелене. **Візерунок:** темно-зелені вузькі шипуваті смуги.

Забарвлення м'якуша: малиновий. **Хімічний склад**

м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,2%, загального цукру – 6,7%, вітаміну С – 6,1 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: урожайний; високоякісний (смакові якості – 4,5–4,7 бали); придатний для переробки насіння на олію.



МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 60

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Галка О.Т.

Термін дозрівання, діб: 95–100, середньопізній.

Маса плоду, кг: 5,0–6,0 (окремі до 10,0–14,0). **Форма**

плоду: округло-видовжена.

Урожайність, т/га: 40,0–50,0.

Забарвлення плоду: світло-зелене. **Візерунок:** темно-зелені широкі шипуваті смуги.

Забарвлення м'якуша: рожевий. **Хімічний склад**

м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,4%, загального цукру – 7,5%, вітаміну С – 8,4 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: відмінні смакові якості (4,9–5,0 бали), висока транспортабельність і лежкість (до трьох місяців).

КАВУН



НІКОПОЛЬСЬКИЙ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич З.Д., Книш Г.І.

Термін дозрівання, діб: 85–90, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 3,7–6,0. **Форма плоду:** округла.

Урожайність, т/га: 32–35.

Забарвлення плоду: зелене. **Візерунок:** темно-зелені широкі шипуваті смуги.

Забарвлення м'якуша: рожевий. **Хімічний склад**

м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,6%, загального цукру – 8,5%, вітаміну С – 8,0 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: високоврожайний, стійкий проти посухи і розтріскування, конкурентоспроможний, високі смакові якості.



ОБРІЙ F₁

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич З.Д., Сич І.М., Лебедєва А.Т., Полівода Л.І.

Термін дозрівання, діб: 73–75, ультраскоростиглий гібрид.

Маса плоду, кг: 2,5–3,0. **Форма плоду:** округла.

Урожайність, т/га: 20,0–25,0.

Забарвлення плоду: темно-зелене без чітко вираженого візерунку.

Забарвлення м'якуша: червоний. **Хімічний склад**

м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,0%, загального цукру – 8,1%, вітаміну С – 7,9 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: висока однорідність; холодостійкість; дружність достигання; ультраскоростиглість; підвищена стійкість проти фузаріозного в'янення; високі смакові якості (4,6–4,8 бали).



ПІВНІЧНЕ СЯЙВО

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич З.Д., Сич І.М., Лебедєва А.Т., Кузьміна І.М.

Термін дозрівання, діб: 62–64, ультраскоростиглий.

Маса плоду, кг: 1,4–2,0. **Форма плоду:** округла.

Урожайність, т/га: 20,0–25,0.

Забарвлення плоду: зелене без чітко вираженого візерунку.

Забарвлення м'якуша: карміново-червоний. **Хімічний**

склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,7%, загального цукру – 7,3%, вітаміну С – 7,1 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: ультраскоростиглий, придатний для вирощування в Лісостепу і Поліссі України; порційні плоди; дружна віддача врожаю; добрі смакові якості (4,4–4,6 бали).



СЕРПЕНЬ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич З.Д., Сидорка І.В., Заверталюк В.Ф.

Термін дозрівання, діб: 86–95, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 3,0–4,0. **Форма плоду:** округла.

Урожайність, т/га: 27,0–31,0.

Забарвлення плоду: світло-зелене. **Візерунок:** зелені вузькі шипуваті смуги.


Забарвлення м'якуша: яскраво рожевий. **Хімічний**

склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,5%, загального цукру – 6,6%, вітаміну С – 6,0 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: пластичність (здатність формувати сталу урожайність у різні роки); стійкість до посухи і антракнозу; високі смакові якості (4,6–4,8 бали).

КАВУН



СІЧЕСЛАВ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Книш Г.І., Сич З.Д., Сич І.М., Лапіна З.В., Приходько В.М.

Термін дозрівання, діб: 85–90, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 3,0–4,0. **Форма плоду:** округла.

Урожайність, т/га: 30,0–35,0.

Забарвлення плоду: світло-зелене. **Візерунок:** темно-зелені широкі фестончаті смуги.

Забарвлення м'якуша: рожевий. **Хімічний склад**

м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,5%, загального цукру – 8,5%, вітаміну С – 9,3 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: висока стійкість проти посухи і баштанної попелиці; відноситься до сортотипу Кримсон; високі смакові якості (4,6–4,8 бали).



СКАРБ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич З.Д., Сич І.М.

Термін дозрівання, діб: 96–100, середньопізній.

Маса плоду, кг: 3,0–5,0. **Форма плоду:** округло-видовжена.

Урожайність, т/га: 40,0–47,0.

Забарвлення плоду: світло-зелене. **Візерунок:** темно-зелені широкі шипуваті смуги.

Забарвлення м'якуша: рожевий. **Хімічний склад**

м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,9%, загального цукру – 8%, вітаміну С – 9,1 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: листок нерозсічений; висока врожайність; високоякісна продукція в осінній період; зберігання до двох місяців; висока стійкість проти фузаріозного в'янення і антракнозу; високі смакові якості (4,7–4,8 бали).



ФАВОРИТ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич З.Д., Сич І.М., Сидорка І.В.

Термін дозрівання, діб: 78–85, середньоранній.

Маса плоду, кг: 3,7–6,0. **Форма плоду:** циліндрична.

Урожайність, т/га: 35–40. Дуже відзивається на зрошування, при поливі урожайність підвищується у 1,5–2 рази.

Забарвлення плоду: світло-зелене. **Візерунок:** темно-зелена крупна мозаїка.

Забарвлення м'якуша: рожевий. **Хімічний склад**

м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 11,7%, загального цукру – 9,2%, вітаміну С – 10,0 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: стійкий проти перезрівання і мацерації плодів (зберігання до двох місяців); висока товарність плодів; висока транспортабельність; відмінні смакові якості (4,9–5,0 бали).



ЧУМАК

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич З.Д., Сидорка І.В., Полівода Л.І., Заверталюк В.Ф.

Термін дозрівання, діб: 85–95, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 2,8–4,0 (окремі до 5,0–6,0). **Форма плоду:** округла. **Урожайність, т/га:** 36,0–40,0.

Забарвлення плоду: біле. **Візерунок:** світло-салатові широкі шипуваті смуги.

Забарвлення м'якуша: рожевий. **Хімічний склад**

м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,4%, загального цукру – 7,5%, вітаміну С – 8,4 мг%.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: високостійкий до сонячних опіків, перезрівання та мацерації м'якуша; висока транспортабельність і лежкість (до двох місяців); високі смакові якості (4,8–5,0 бали).

ДИНЯ



БЕРЕГИНЯ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Томасон Р.Ю., Томасон М.І., Сич З.Д.

Термін дозрівання, діб: 85–92, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 1,2–3,0 (окремі до 5,0).

Урожайність, т/га: 18,0–28,0. **Форма плоду:** овальна.

Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, сітка середня, щільна, незв'язана, середньочарункова. **М'якуш:** білий, середній, ніжний, дуже щільний, соковитий, солодкий.

Хімічний склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 11,1%, загального цукру – 8,1%, вітаміну С – 18,4 мг%. Смакові якості високі – 4,4–4,9 балів.

Стійкість до хвороб: середньостійкий.

Особливості: високоврожайний, високоякісний, придатний до транспортування на далекі відстані і тривалого зберігання (15–30 діб). Посухостійкий.



ДАЯНА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Томасон М.І., Палінчак О.В., Заверталюк В.Ф., Дроздік О.О., Бойко В.А.

Термін дозрівання, діб: 81–83, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 1,3–1,9 (окремі до 6,0). **Урожайність, т/га:** 24,2–26,7. **Форма плоду:** широкоовальна.

Забарвлення плоду: брунатно-оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, плід злегка зморшковатий біля плодоніжки, сітка слабка, нещільна, незв'язана, крупночарункова.

М'якуш: білий, середній, ніжний, маслянистий, соковитий, солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 9,9%, загального цукру – 6,7%, вітаміну С – 16,1 мг%. Смакові якості високі – 4,7–4,8 бали.

Стійкість до хвороб: середньостійкий.

Особливості: високоврожайний, високоякісний, подовжує період споживання свіжої продукції дини до вересня-жовтня. Транспортабельність і лежкість середня. Посухостійкий.



ДУМКА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Томасон Р.Ю., Палінчак О.В., Сич З.Д., Полівода Л.І.

Термін дозрівання, діб: 80–84, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 1,0–1,6. **Урожайність, т/га:** 18,0–25,0.

Форма плоду: округла.

Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, сітка відсутня або слабка, незв'язана.

М'якуш: білий, середній, ніжний, щільний, соковитий, солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 11,0%, загального цукру – 7,9%, вітаміну С – 20,3 мг%. Смакові якості високі – 4,6–4,8 бали.

Стійкість до хвороб: середньостійкий.

Особливості: високоврожайний, стабільно висока якість свіжої продукції. Транспортабельність і лежкість середня. Посухостійкий.



ЗАБАВКА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Томасон Р.Ю., Палінчак О.В., Сич З.Д., Полівода Л.І., Дроздік О.О., Цьок Л.В.

Термін дозрівання, діб: 58–62, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 0,7–0,9. **Урожайність, т/га:** 9,0–10,3.

Форма плоду: короткоовальна. **Забарвлення плоду:** жовто-оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, сітка слабка, нещільна, слабкозв'язана, мілкочарункова.

М'якуш: білий, середній, ніжний, картоплянистий, соковитий, солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 9,6%, загального цукру – 6,7%, вітаміну С – 19,8 мг%. Смакові якості середні – 4,0–4,4 бали.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: рослина короткоплетиста, ультраранньостиглий, порційні плоди. Транспортабельність і лежкість середня. Посухостійкий.

ДИНЯ



ЗЛАТА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Томасон Р.Ю., Палінчак О.В.

Термін дозрівання, діб: 80–82, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 1,3–1,7 (окремі до 4,0).

Урожайність, т/га: 18,0–22,0.

Форма плоду: коротко-овальна або округла.

Забарвлення плоду: жовто-оранжеве та оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, сітка на початку досягання часткова (біля основи чи вершини плоду), зв'язана (середньочарункова), середня, ніжна. **М'якуш:** білий, середній, ніжний, щільний, соковитий, солодкий.

Хімічний склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 11,3%, загального цукру – 8,1%, вітаміну С – 16,0 мг%. Смакові якості високі – 4,4–4,8 балів.

Стійкість до хвороб: середньостійкий.

Особливості: високоврожайний, високоякісний, приваблює забарвлення та інтенсивний аромат плодів. Транспортальність і лежкість середня. Посухостійкий.



ІНЕЯ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Томасон Р.Ю., Томасон М.І., Сич З.Д., Сич І.М.

Термін дозрівання, діб: 84–94, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 1,0–1,5 (окремі до 2,4).

Урожайність, т/га: 17,0–25,0.

Форма плоду: короткоовальна.

Забарвлення плоду: оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, сітка середня, нещільна, незв'язана, середньочарункова. **М'якуш:** білий, середній, ніжний, щільний, соковитий, дуже солодкий.

Хімічний склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 12,0%, загального цукру – 8,7%, вітаміну С – 18,0 мг%. Смакові якості високі – 4,9–5,0 балів.

Стійкість до хвороб: середньостійкий.

Особливості: стабільно висока якість продукції, добре зберігається (15–20 діб), транспортабельність середня. Посухостійкий.



ЛИПНЕВА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Томасон Р.Ю., Томасон М.І., Сущенко К.О., Сич З.Д.

Термін дозрівання, діб: 69–70, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 1,1–1,5. **Урожайність, т/га:** 14,0–18,0.

Форма плоду: округла.

Забарвлення плоду: лимонно-жовте, без візерунка, поверхня сегментована, сітка часткова (біля основи чи вершини плоду), зв'язана (крупночарункова), середня, ніжна.

М'якуш: білий з кремовим відтінком, середній, ніжний, танучий солодкий, з сильним динним ароматом.

Хімічний склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,7%, загального цукру – 7,3%, вітаміну С – 19,0 мг%. Смакові якості середні – 4,2–4,5 балів.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: ранньостиглий, сильний динний аромат, ніжний соковитий м'якуш; призначений для місцевого споживання. Посухостійкий.



САМАРСЬКА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Томасон Р.Ю., Галка О.Т., Томасон М.І., Кононенко А.І.

Термін дозрівання, діб: 83–85, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 1,3–1,7 (окремі до 3,5).

Урожайність, т/га: 18,0–26,0. **Форма плоду:** овальна.

Забарвлення плоду: жовте, без візерунка, поверхня сегментована, сітка часткова (біля основи чи вершини плоду), зв'язана (крупночарункова), середня, ніжна.

М'якуш: білий або блідо-зелений, товстий, ніжний, маслянистий, солодкий, з динним ароматом.

Хімічний склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,0%, загального цукру – 8,5%, вітаміну С – 15,0 мг%. Смакові якості середні – 4,0–4,4 балів.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: сильний динний аромат, танучий м'якуш; посухостійкий та холодостійкий.

ДИНЯ



ТІНА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Палінчак О.В., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., Дроздік О.О.

Термін дозрівання, діб: 70–72, середньоранній.

Маса плоду, кг: 0,9–1,4 (окремі до 2,5).

Урожайність, т/га: 15,0–16,9. **Форма плоду:** овальна.

Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, сітка середня, щільна, зв'язана, мілкочарункова.

М'якуш: білий, середній, ніжний, щільний, соковитий, солодкий.

Хімічний склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,6%, загального цукру – 5,8%, вітаміну С – 20,5 мг%. Смакові якості високі – 4,6–4,7 бали.

Стійкість до хвороб: середньостійкий.

Особливості: врожайний, високоякісний, високотранспортабельний, лежкість середня. Посухостійкий.



ТІТОВКА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Томасон Р.Ю., Томасон М.І., Томасон Я.Р., Сич З.Д., Полівода Л.І., Бєлєвцова Л.О.

Термін дозрівання, діб: 57–65, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 1,1–2,0 (окремі до 3,5).

Урожайність, т/га: 14,0–18,0. **Форма плоду:** коротко-овальна.

Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, сітка на початку достигання часткова (біля основи чи вершини плоду), зв'язана (середньочарункова), густа або середня, ніжна.

М'якуш: білий, товстий, ніжний, слабволокнистий, соковитий, солодкий, з характерним ароматом дині.

Хімічний склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,4%, загального цукру – 7,1%, вітаміну С – 26,8 мг%.

Смакові якості високі – 4,2–4,8 бали.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: ультраскоростиглий, висока віддача врожаю в першу декаду плодоношення (44–100%), високоякісний. Транспортабельність середня (транспортується на невеликій відстані). Лежкість середня. Посухостійкий.



ЧАЙКА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Термін дозрівання, діб: 78–80, середньоранній.

Маса плоду, кг: 1,0–1,5 (окремі до 2,5).

Урожайність, т/га: 12,0–14,0. **Форма плоду:** овальна.

Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, сітка середня, нещільна, зв'язана (середньочарункова), ніжна.

М'якуш: білий, середній, ніжний, волокнистий, соковитий, солодкий.

Хімічний склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,0%, загального цукру – 6,9%, вітаміну С – 20,0 мг%.

Смакові якості високі – 4,7–4,8 бали.

Стійкість до хвороб: середньостійкий до бактеріозу, альтернаріозу, пероноспорозу, борошнистої роси та баштанної попелиці.

Особливості: високоврожайний, високоякісний, відповідає вимогам українського споживача щодо зовнішнього вигляду плоду. Транспортабельність і лежкість середня. Посухостійкий.

ГАРБУЗ



БАЛЬЗАМ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., Білай О.В.

Ботанічний вид: гарбуз мускатний (*Cucurbita moschata* Duch. ex Poir.). **Рослина:** довгостеблова, дуже потужна, головне стебло – 3-4 м. **Термін дозрівання, дів:** 125-130, пізньостиглий. **Маса плоду, кг:** 4,6-6,2. **Форма плоду:** слабосплюснута. **Урожайність, т/га:** плодів – 36,0-42,0, насіння – 0,18-0,25.

Забарвлення плоду: коричневе, без візерунку. **М'якуш:** темно-оранжевий, хрумкий, середньої щільності, соковитий, солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 9,6-10,2%, загального цукру – 6,7-7,5%, каротину – 15,6-18,0 мг%, вітаміну С – 12,0-13,5 мг%, пектину – 1,5-1,9%.

Насіння: мілке і середнє (1,3-1,7 см), сірувате, маса 1000 шт. – 130-150 г. **Стійкість до хвороб:** практично стійкий. **Використання:** столове.

Особливості: високоврожайний, посухостійкий, високі смакові якості, найкращий сорт для переробки на сік і пюре.



ГАМЛЕТ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І.

Ботанічний вид: гарбуз звичайний (*Cucurbita pepo* L.).

Рослина: напівкущова, головне стебло довжиною 1,5-3,0 м.

Термін дозрівання, дів: 85-95, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 2,6-3,2. **Форма плоду:** сплюснута і округла.

Урожайність, т/га: плодів – 26,0-40,0, насіння – 0,31-0,56.

Забарвлення плоду: оранжеве. **Візерунок:** темно-оранжеві плямисті широкі смуги. **М'якуш:** жовто-кремовий, товщиною 3,0-5,0 см, хрумкий, середньої щільності, мало солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 6,0-7,0%, загального цукру – 4,2-4,9%, каротину – 2,2-2,8 мг%, вітаміну С – 6,5-7,6 мг%, пектину – 0,4-0,5%.

Насіння: середнє (1,6-2,2 см), голе, світло-зелене, маса 1000 ядер – 170-200 г. **Стійкість до хвороб:** порівняно стійкий.

Використання: насіння – в кондитерській і олійній промисловості. **Особливості:** голонасінний, насіння користується високим попитом на внутрішньому і світовому ринках.



ВАЛОК

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І., Галка О.Т., Білей Л.П.

Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (*Cucurbita maxima* Duch.). **Рослина:** кущова, потужна, діаметр куща 0,6-0,7 м.

Термін дозрівання, дів: 110-120, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 3,0-4,0. **Форма плоду:** середньосплюснута.

Урожайність, т/га: плодів – 30,0-40,0, насіння – 0,51-0,72.

Забарвлення плоду: сіре. **Візерунок:** світло-сірі плями.

М'якуш: світло-оранжевий, крихкий, соковитий, мало солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 6,0-8,0%, загального цукру – 4,0-6,0%, каротину – 3-4 мг%, вітаміну С – 9,0-10,0 мг%, пектину – 1,0-1,2%.

Насіння: середнє і крупне (1,6-2,3 см), біле, маса 1000 шт. – 250-300 г. **Стійкість до хвороб:** практично стійкий.

Використання: столове.

Особливості: придатний для механізованого вирощування і збирання за рахунок кущової форми рослин і формування природного валка, висока насіннева продуктивність у порівнянні з іншими сортами.



ДОЛЯ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., Білай О.В.

Ботанічний вид: гарбуз мускатний (*Cucurbita moschata* Duch. ex Poir.).

Рослина: довгостеблова, дуже потужна, головне стебло довге (3-4 м).

Термін дозрівання, дів: 118-126, середньостиглий. **Маса плоду, кг:** 2,4-3,4. **Форма плоду:** пряма вкорочена і видовжена перехватка.

Урожайність, т/га: плодів – 25,0-30,0, насіння – 0,20-0,27.

Забарвлення плоду: коричневе, без візерунку. **М'якуш:** інтенсивно-оранжевий, хрумкий, середньої щільності, соковитий, солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 6,9-10,6%, загального цукру – 4,8-6,5%, каротину – 14,6-19,6 мг%, вітаміну С – 11,0-12,6 мг%, пектину – 1,3-1,8%.

Насіння: мілке і середнє (1,4-1,8 см), сірувате, маса 1000 шт. – 130-150 г.

Стійкість до хвороб: практично стійкий. **Використання:** столове. **Особливості:** скоростиглий, урожайний, посухостійкий дружно досягає, високі смакові якості, плоди придатні для переробки на сік і пюре.

ГАРБУЗ



ЖДАНА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І., Сич З.Д., Селегей А.В.

Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (*Cucurbita maxima* Duch.). **Рослина:** довгостеблова, потужна, головне стебло – 2,5-3,0 м.

Термін дозрівання, дб: 125-130, пізньостиглий.

Маса плоду, кг: 3,2-5,0 (окремі до 10,0 кг). **Форма плоду:** сильно- або середньосплюснута.

Урожайність, т/га: плодів – 25,0-35,0, насіння – 0,18-0,28.

Забарвлення плоду: сіре. **Візерунок:** ледь помітна світло-сіра плямистість. **М'якуш:** червоно-оранжевий, хрумкий, щільний, середньосоковитий, дуже солодкий.

Хімічний склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 12,0-14,0% (до 15,0-16,0%), загального цукру – 7,5-9,0%, каротину – 12-15 мг%, вітаміну С – 13,0-14,0 мг%, пектину – 1,7-2,0%. **Насіння:** середнє і крупне (1,6-2,5 см), світло-коричневе, маса 1000 шт. – 250-350 г. **Стійкість до хвороб:** практично стійкий. **Використання:** столове.

Особливості: високі смакові якості, придатний для довготривалого зберігання, для використання в кулінарії і переробки на гарбузові консерви.



ЛЕЛЬ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І., Сич З.Д., Щербина Т.І., Селегей А.В.


Ботанічний вид: гарбуз звичайний (*Cucurbita pepo* L.).

Рослина: кущова, середньої потужності, діаметр куща 60-70 см. **Термін дозрівання, дб:** 85-95, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 2,7-4,0. **Форма плоду:** сплюснута (індекс плоду – 0,6-0,8). **Урожайність, т/га:** плодів – 27,0-40,0, насіння – 0,40-0,64. **Забарвлення плоду:** оранжеве. **Візерунок:** темно-оранжеві плямисті широкі смуги. **М'якуш:** жовтий, товщиною 3,5-5,0 см, хрумкий, середньої щільності, соковитий, мало солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 6,0-8,0%, загального цукру – 4,2-5,0%, каротину – 2,0-4,0 мг%, вітаміну С – 7,0-8,0 мг%, пектину – 0,5-0,6%. **Насіння:** середнє і крупне (1,7-2,0 см), кремове, маса 1000 шт. – 170-230 г. **Стійкість до хвороб:** порівняно стійкий до хвороб і баштанної попеліци.

Використання: столове, насіннєве, кормове.

Особливості: кущовий, придатний до механізованого збирання комбайнами, насіння користується високим попитом на внутрішньому і світовому ринках.



МАСЛЯНКА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І., Білай О.В.

Ботанічний вид: гарбуз звичайний (*Cucurbita pepo* L.).

Рослина: довго стеблова, головне стебло довжиною 1,5-3,0 м.

Термін дозрівання, дб: 85-95, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 2,5-4,0. **Форма плоду:** сплюснута і коротко-овальна. **Урожайність, т/га:** плодів – 20,0-30,0, насіння – 0,28-0,48. **Забарвлення плоду:** оранжеве. **Візерунок:** темно-оранжеві плямисті широкі смуги. **М'якуш:** кремовий, товщиною 3,5-5,0 см, хрумкий, середньої щільності, мало солодкий.

Хімічний склад м'якуша: вміст сухої розчинної речовини – 5,4-6,0%, загального цукру – 3,2-4,3%, каротину – 2,0-3,0 мг%, вітаміну С – 8,0-9,0 мг%, пектину – 0,5-0,6%. **Насіння:** голе, середнє (1,6-1,9 см), зелене, маса 1000 ядер – 200-210 г. **Стійкість до хвороб:** порівняно стійкий. **Використання:** насіння – в кондитерській і олійній промисловості. **Особливості:** ультранасінний, посухостійкий, голонасінний, насіння користується високим попитом на внутрішньому і світовому ринках.



НАРОДНИЙ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І., Заверталюк В.Ф.

Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (*Cucurbita maxima* Duch.).

Рослина: довгостеблова, потужна, головне стебло – 2,5-3,0 м. **Термін дозрівання, дб:** 108-125, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 7,5-10,0 (окремі до 15,0-20,0). **Форма плоду:** середньосплюснута і округла. **Урожайність, т/га:** плодів – 40,0-60,0, насіння – 0,32-0,54.

Забарвлення плоду: рожеве з оранжевим відтінком. **Візерунок:** кремові міжсегментні смуги. **М'якуш:** світло-оранжевий, крихкий, соковитий, мало солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 4,0-6,0%, загального цукру – 3,0-4,0%, каротину – 3-4 мг%, вітаміну С – 9,0-11,4 мг%, пектину – 0,9-1,2%. **Насіння:** середнє і крупне (2,0-2,5 см), біле, маса 1000 шт. – 300-400 г. **Стійкість до хвороб:** практично стійкий.

Використання: універсальне (кормового, насіннєвого призначення). **Особливості:** високоврожайний, висока насіннєва продуктивність, насіння користується високим попитом на внутрішньому і світовому ринках.

ГАРБУЗ



ПОЛЯНИН

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І., Полівода Л.І.

Ботанічний вид: гарбуз мускатний (*Cucurbita moschata* Duch. ex Poir.). **Рослина:** довгостеблова, потужна, головне стебло – 3-4 м. **Термін дозрівання, діб:** 121-141, пізньостиглий. **Маса плоду, кг:** 4,2-7,2. **Форма плоду:** видовжено-перцевидна.

Урожайність, т/га: плодів – 30,0-53,0, насіння – 0,15-0,26.

Забарвлення плоду: світло-коричневе, без візерунку.

М'якуш: темно-оранжевий, хрумкий, середньої щільності, соковитий, солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 7,7-9,3%, загального цукру – 5,0-6,5%, каротину – 10,0-14,0 мг%, вітаміну С – 11,0-12,0 мг%, пектину – 1,3-1,8%. **Насіння:** мілке і середнє (1,3-1,6 см), сірувате, маса 1000 шт. – 130-150 г. **Стойкість до хвороб:** практично стійкий. **Використання:** столове.

Особливості: високоврожайний, посухостійкий, високі смакові якості, придатність для переробки на сік і пюре.



СВІТЕНЬ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І.

Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (*Cucurbita maxima* Duch.). **Рослина:** кущова, потужна, діаметр куща 0,6-0,8 м. **Термін дозрівання, діб:** 108-25, середньостиглий.

Маса плоду, кг: 3,5-4,6. **Форма плоду:** середньосплюснута.

Урожайність, т/га: плодів – 35,0-46,0, насіння – 0,60-0,83.

Забарвлення плоду: світло-сіре без чітко вираженого візерунку. **М'якуш:** оранжевий, хрумкий, соковитий, мало солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 7,0-8,0%, загального цукру – 5,0-6,0%, каротину – 4-8 мг%, вітаміну С – 10,0-12,2 мг%, пектину – 1,1-1,3%.

Насіння: середнє і крупне (1,8-2,3 см), біле, маса 1000 шт. – 280-350 г. **Стойкість до хвороб:** практично стійкий.

Використання: столове.

Особливості: повністю придатний для механізованого вирощування і збирання, висока насіннева продуктивність у порівнянні з іншими сортами, універсального використання.



СЛАВА F₁

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., Білай О.В.

Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (*Cucurbita maxima* Duch.). **Рослина:** довгостеблова, потужна, головне стебло – 2,5-3,0 м. **Термін дозрівання, діб:** 125-128, пізньостиглий.

Маса плоду, кг: 3,9-8 (окремі до 8,0). **Форма плоду:** середньосплюснута. **Урожайність, т/га:** плодів – 26,0-32,0, насіння – 0,16-0,22.

Забарвлення плоду: світло-сіре без чітко вираженого візерунку. **М'якуш:** червоно-оранжевий, хрумкий, щільний, середньосоковитий, дуже солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 11,0-13,0% (до 14%), загального цукру – 7,0-9,0%, каротину – 12-14 мг%, вітаміну С – 12,0-14,0 мг%, пектину – 1,5-1,8%. **Насіння:** середнє і крупне (1,6-2,5 см), світло-коричневе, маса 1000 шт. – 260-320 г.

Стойкість до хвороб: практично стійкий. **Використання:** столове. **Особливості:** високі смакові якості, висока транспортельність, придатний для довготривалого зберігання та для переробки на гарбузові консерви.



СЛАВУТА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Галка О.Т.

Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (*Cucurbita maxima* Duch.). **Рослина:** довгостеблова, потужна, головне стебло – 1,6-2,0 м. **Термін дозрівання, діб:** 130-150, пізньостиглий. **Маса плоду, кг:** 5,0-6,0. **Форма плоду:** сильно- або середньосплюснута.

Урожайність, т/га: плодів – 20,0-30,0, насіння – 0,14-0,24.

Забарвлення плоду: темно-сіре. **Візерунок:** світло-сіра плямистість (мармуровий рисунок) та сірувато-кремові смуги.

М'якуш: червоно-оранжевий, хрумкий, щільний, середньосоковитий, дуже солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 12,0-15,0% (до 17,0%), загального цукру – 8,0-10,0%, каротину – 10-12 мг%, вітаміну С – 13,0-14,0 мг%, пектину – 1,8-2,0%.

Насіння: середнє і крупне (1,6-2,5 см), світло-коричневе, маса 1000 шт. – 250-350 г. **Стойкість до хвороб:** практично стійкий. **Використання:** столове. **Особливості:** відмінні смакові якості, для довготривалого зберігання та для переробки на гарбузові консерви.

ГАРБУЗ



гарбуз Український багатоплідний

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Галка О.Т., Новицька О.І.


Ботанічний вид: гарбуз звичайний (*Cucurbita pepo* L.).

Рослина: довгостеблова, головне стебло довжиною 1,5–3,0 м. **Термін дозрівання, діб:** 90–100, ранньостиглий.

Маса плоду, кг: 4–6 кг. **Форма плоду:** коротко-овальна і обернено-яйцевидна. **Урожайність, т/га:** плодів – 25,0–40,0, насіння – 0,24–0,39.

Забарвлення плоду: світло-оранжеве. **Візерунок:** темно-оранжеві плямисті широкі смуги. **М'якуш:** світло-оранжевий, товщиною 4–6 см, хрумкий, соковитий, мало солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 7,8–10,4%, загального цукру – 6,2–7,5%, вітаміну С – 8,4 мг%, пектину – 0,6%. **Насіння:** середнє і крупне (1,8–2,1 см), кремове, маса 1000 шт. – 180–250 г. **Стійкість до хвороб:** порівняно стійкий. **Використання:** столове, насіннєве, кормове.

Особливості: найбільш скоростиглий столовий сорт гарбуза, посухостійкий, транспортабельний, насіння користується високим попитом на внутрішньому і світовому ринках.



ЮВІЛЕЙ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Колесник І.І., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., Білай О.В.

Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (*Cucurbita maxima* Duch.). **Рослина:** довгостеблова, потужна, головне стебло – 2,5–3,0 м. **Термін дозрівання, діб:** 125–128, пізньостиглий.

Маса плоду, кг: 3,9–4,8 (окремі до 8,0 кг). **Форма плоду:** середньосплюснута.

Урожайність, т/га: плодів – 26,0–32,0, насіння – 0,16–0,22.

Забарвлення плоду: світло-сіре без чіткого візерунку. **М'якуш:** червоно-оранжевий, хрумкий, щільний, середньосолодкий, дуже солодкий. **Хімічний склад м'якуша:** вміст сухої розчинної речовини – 11,0–13,0% (до 14,0%), загального цукру – 7,0–9,0%, каротину – 12–14 мг%, вітаміну С – 12,3–13,6 мг%, пектину – 1,6–2,0%.

Насіння: середнє і крупне (1,6–2,5 см), світло-коричневе, маса 1000 шт. – 260–320 г. **Стійкість до хвороб:** практично стійкий. **Використання:** столове.

Особливості: високі смакові якості, високо транспортабельний, придатний для довготривалого зберігання та для переробки на гарбузові консерви.

БУРЯК СТОЛОВИЙ



ГОПАК

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич І.М., Заверталюк В.Ф., Василяк І.М., Полівода Л.І., Палінчак О.В.

Достигання, діб: до технічної стиглості – 115–130, середньостиглий. **Використання:** універсальне.

Коренеплід: діаметр – 10–15 см. **Маса, г:** 250–300.

Форма коренеплоду: овально-округлий (сортотип Бордо).

Забарвлення: коренеплоду – червоне з відтінком бордо, м'якуша – червоне з сильним фіолетовим відтінком.

Урожайність, т/га: 35,0–80,0. Вміст сухої речовини: 15,4–18,0%. **Стійкість до хвороб:** практично стійкий до хвороб коренеплодів.

Особливості: високоврожайний в різних ґрунтово-кліматичних умовах, посухостійкий, висока якість коренеплодів (4,6–4,8 бали), подовжена тривалість зберігання (90–97%).

ТОМАТ



БЕНЕФІС

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Заверталюк В.Ф., Колесник І. І., Коваленко Є.М., Олексієнко В.Г.

Термін дозрівання, діб: 95–100, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: слабо-сплюснутий і округлий, гладенький.

Тип рослини (сила росту): детермінантний, нештамбовий, прямостоячий, середньорослий, висота головного стебла – 35–45 см.

Маса плоду, г: 80–90. Забарвлення плоду: зрілого – червоне, незрілого – зеленувато-білясте, без темної плями біля плодоніжки. **Використання:** у свіжому вигляді і в консервній промисловості. **Врожайність, т/га:** 40–50. Вміст сухої речовини, %: 4,8–5,1.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: ультраранньостиглий, дружна віддача врожаю, добрий сахаро-кислотний коефіцієнт, невибагливий до умов вирощування.



ТАЛАН

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Томасон М.І., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., Палінчак О.В., Бойко В.А.

Термін дозрівання, діб: 98–105, ранньостиглий.

Форма (тип) плоду: сплюснуто-округлий, гладенький і слабо ребристий.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, нештамбова, прямостояча, середньо-розгалужена, середньоросла, висота головного стебла – 40–50 см.

Маса плоду, г: 81–96. Забарвлення плоду: зрілого – червоне, незрілого – світло-зелене, без темної плями біля плодоніжки.

Використання: у свіжому вигляді і в консервній промисловості. **Врожайність, т/га:** 40–50. Вміст сухої речовини, %: 5,8–6,2.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: ранньостиглий, дружна віддача врожаю, високі смакові якості свіжих і консервованих плодів, невибагливий до умов вирощування.



БОЯРИН

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич І.М., Заверталюк В.Ф., Василяк І.М., Полівода Л.І., Палінчак О.В.

Термін дозрівання, діб: 110–115, середньостиглий.

Форма (тип) плоду: овальний, гладенький.

Тип рослини (сила росту): детермінантна, нештамбова, прямостояча, середньо-розгалужена, середньоросла, висота головного стебла – 45–50 см.

Маса плоду, г: 90–110. Забарвлення плоду: зрілого – червоне, незрілого – світло-зелене, із слабо вираженою плямою біля плодоніжки.

Використання: у свіжому вигляді і в консервній промисловості. **Врожайність, т/га:** 50–70. Вміст сухої речовини, %: 5,8–6,8.

Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.

Особливості: універсального використання, високотранспортабельний, придатний для вирощування за інтенсивною технологією, відмінні смакові якості, один з кращих сортів для переробки на томатопродукти.

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА



БАТИР

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Заверталюк В.Ф., Колесник І. І., Коваленко Є.М., Олексієнко В.Г.

Напрямок використання: універсальний, гострий.

Вегетаційний період, діб: 100-115, середньостиглий.

Урожайність, т/га: 30-40 (з міжряддя 70 см). **Лежкість:** 8-9 місяців. **Форма цибулин:** округло-плескатої і округлої форми зі збігом вверху і донизу. **Колір покривних лусок:** світло-коричневий і темно-жовтий.

Колір соковитих лусок: білі.

Маса цибулин, г: 60-100. Вміст сухої речовини, %: 13,0-15,0.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: добрі смакові якості, добре визріває на момент збирання, висока лежкість (зберігається до 9-10-ти місяців), високопластичний сорт.



ОБЕРІГ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Заверталюк В.Ф., Колесник І. І., Коваленко Є.М., Олексієнко В.Г.

Напрямок використання: салатний, напівгострий.

Вегетаційний період, діб: 110-130, середньопізній.

Урожайність, т/га: 30-45 (з міжряддя 70 см). **Лежкість:** 6-7 місяців. **Форма цибулин:** округло-плеската зі збігом донизу (форма чугунка). **Колір покривних лусок:** від світло-жовтого до темно-жовтого. **Колір соковитих лусок:** білі. **Маса цибулин, г:** 50-180. Вміст сухої речовини, %: 10,0-12,0.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: висока врожайність, високі смакові якості, привабливий товарний вигляд, добре визріває на момент збирання.



АНТОНІНА

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Сич З.Д., Колесник І. І., Коваленко Є.М.

Напрямок використання: салатний, напівгострий.

Вегетаційний період, діб: 115-130, середньопізній.

Урожайність, т/га: 30-40 (з міжряддя 70 см). **Лежкість:** 5-6 місяців.

Форма цибулин: округло-плеската зі збігом донизу (форма чугунка).

Колір покривних лусок: фіолетово-червоний.

Колір соковитих лусок: білі з фіолетовим епідермісом.

Маса цибулин, г: 100-150. Вміст сухої речовини, %: 10,5-12,0. **Стійкість до хвороб:** толерантність.

Особливості: великі соковиті цибулини привабливого виду, високі смакові якості, висока потенційна врожайність.

ЦИБУЛЯ ШАЛОТ



ДЖИГІТ

Компанія оригінатор:

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН

Автори: Коваленко Є.М., Сич З.Д., Полівода Л.І., Заверталюк В.Ф. **Маса цибулинок, г:** 19-24. **Маса цибулини, г:** 120-129 (5,1-6,8 цибулинок). **Термін дозрівання, діб:** 73-75.

Урожайність цибулин, т/га: 20-25 (з міжряддя 70 см).

Лежкість, %: 90,0. **Урожайність зеленого пера, т/га:** 25,0-30,0. **Форма цибулин:** видовжена і сигароподібна.

Колір покривних лусок: жовто-коричневі.

Колір соковитих лусок: білі з фіолетовим відтінком.

Смак: гострий. **Вміст сухої речовини, %:** в цибулинах – 13,0-14,3; в листках – 8,0-8,3.

Використання: універсального призначення.

Особливості: висока врожайність і лежкість після тривалого зберігання, висока дружність відростання, високі смакові якості цибулин і зеленого пера.

Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН

БАМІЯ (ГІБІСК ЇСТІВНИЙ)



СОПІЛКА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В.

Достигання, діб: 58-68, середньостиглий.

Загальна урожайність, т/га: 2,5.

Маса, г: 7,8-8.

Період плодоношення, діб: 28-34, кількість зборів – 7-9.

Призначення: для дієтичного харчування у переробленому вигляді.

Особливості: придатний для вирощування безрозсадним способом. Сорт середньорослий – висота стебла 115-120 см.



ДІБРОВА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В.

Достигання, діб: 58-68, середньостиглий.

Загальна урожайність, т/га: 2,5-3,0.

Маса, г: 9.

Період плодоношення, діб: 28-34, кількість зборів – 7-9.

Призначення: для дієтичного харчування у переробленому вигляді.

Особливості: придатний для вирощування безрозсадним способом. Сорт низькорослий: висота стебла 65-80 см.

ГІРЧИЦЯ САЛАТНА



ЗОРЯНКА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Чабан Л.В., Позняк О.В., Шабета О.М.

Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 15, ранньостиглий.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 8,5-9,5.

Вміст: сухої речовини – 10,5%, загального цукру – 1,8%.

Призначення: для свіжого споживання.

Особливості: холодостійкий, високовітамінний, стійкий до стеблуння, придатний до загущених посівів.



ПОПЕЛЮШКА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Чабан Л.В., Позняк О.В., Дзюба Л.Б.

Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 22, ранньостиглий.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 9,8.

Вміст: сухої речовини – 10,0%, загального цукру – 1,9%.

Призначення: для свіжого споживання.

Особливості: холодостійкий, високовітамінний, стійкий до стеблуння, придатний до загущених посівів.

ВАСИЛЬКИ СПРАВЖНІ (БАЗИЛІК)



РУТАН

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Хареба В.В.

Достигання, діб: 152-155.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 31-40.

Вміст: сухої речовини – 19,62%, загального цукру – 1,5%, аскорбінової кислоти – 17,30 мг/100 г.

Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа у харчовій промисловості.

Особливості: високі смакові і ароматичні якості, придатний для безрозсадного вирощування.



ПЕРЕКОТИПОЛЕ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Горова Т.К.

Достигання, діб: 155-161.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 25-26.

Вміст: сухої речовини – 15,31%, загального цукру – 0,99%, аскорбінової кислоти – 10,40 мг/100 г.

Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа у харчовій промисловості.

Особливості: декоративний, високі смакові і ароматичні якості.



СЯЙВО

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Хареба В.В.

Достигання, діб: 154-161.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 27-30.

Вміст: сухої речовини – 12,07%, загального цукру – 1,02%, аскорбінової кислоти – 29,67 мг/100 г.

Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа у харчовій промисловості.

Особливості: декоративний, високі смакові і ароматичні якості.

ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ



ЛАНКОВИЙ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Верба Г.С., Позняк О.В., Харицький М.В., Фесенко І.В., Щербатюк Р.В., Голубов Є.О.

Вегетаційний період, дів: 115, середньостиглий.

Висота рослини, см: 82-90. **Біб:** довжина 10 см, ширина – 1,6 см, кількість насінин у бобі -10-12.

Врожайність, т/га: 23,4. Вихід зеленого горошку: 47%.

Використання: для споживання у свіжому вигляді і переробки. **Стійкість до хвороб:** відносно стійкий.

Особливості: придатний для колової культури, пергаментність бобу наявна. Високі смакові якості зеленого горошку.



СПАДОК

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Верба Г.С., Позняк О.В., Маленко А.М., Хареба В.В., Щербатюк Р.В., Голубов Є.О.

Вегетаційний період, дів: 115, середньостиглий.

Висота рослини, см: 135-140. **Біб:** довжина 13 см, ширина – 2,8 см, кількість насінин у бобі – 8-9.

Врожайність, т/га: 28,2. **Використання:** для споживання у свіжому вигляді і переробки.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий.

Особливості: різновидність - цукровий. Високорослий, придатний для колової культури.

КРЕС-САЛАТ (ХРІННИЦЯ ПОСІВНА)



МЕРЕЖИВО

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Чабан Л.В., Позняк О.В., Шабета О.М.

Термін достигання, дів: від масових сходів до товарної стиглості – 20, ранньостиглий.

Призначення: для свіжого споживання.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 8,9.

Особливості: холодостійкий, високовітамінний, декоративний, стійкий до стеблуння, придатний до загущених посівів. Вміст у рослині великої кількості йоду дозволяє використовувати рослину при радіоактивному опроміненні і ставити у один ряд з морепродуктами і хріном.



ХОЛОДОК

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Чабан Л.В., Позняк О.В.

Термін достигання, дів: від масових сходів до товарної стиглості – 22, ранньостиглий.

Призначення: для свіжого споживання.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 7,1.

Особливості: холодостійкий, високовітамінний, декоративний, стійкий до стеблуння, придатний до загущених посівів. Вміст у рослині великої кількості йоду дозволяє використовувати рослину при радіоактивному опроміненні і ставити у один ряд з морепродуктами і хріном.

ІНДАУ (РУКОЛА ШИРОКОЛИСТА)



ЗНАХАР

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Чабан Л.В., Харицький М.В., Маленко А.М., Лещук Н.В.

Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 27.

Призначення: для свіжого споживання.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 26.

Вміст: сухої речовини в зеленій масі – 8,40 %, загального цукру – 1,59 %, вітаміну С – 93,64 мг%.

Особливості: холодостійкий, високовітамінний, стійкий до стеблуння, придатний до загущених посівів.

КРІП ПАХУЧИЙ



САНАТ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Чабан Л.В., Позняк О.В., Ткалич Ю.В., Горова Т.К.

Достигання, діб: 120.

Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа у харчовій промисловості.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 28.

Вміст: сухої речовини – 14,68%, загального цукру – 3,06%, аскорбінової кислоти – 106,34 мг/100 г.

Особливості: високі смакові і ароматичні якості, високовітамінний, має подовжений період господарської придатності, універсального використання.

МАНГОЛЬД (буряк листовий)



КОБЗАР

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автор: Позняк О.В.

Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 50.

Призначення: для свіжого споживання і кулінарної обробки.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 50.

Маса рослини, г: 750.

Вміст: сухої речовини – 11,31%, загального цукру – 1,01%, аскорбінової кислоти – 6,94 мг/100 г.

Особливості: стійкий до стеблуння, придатний до загущених посівів.

МАТЕРИНКА ЗВИЧАЙНА



ОРАНТА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Позняк О.В., Чабан Л.В., Ткалич Ю.В.

Достигання, діб: 135.

Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа у харчовій промисловості.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 48,6.

Вміст: в салатній стадії: сухої речовини – 15,47%, загального цукру – 2,05%, аскорбінової кислоти – 356 мг/100 г; загального цукру в період цвітіння – 3,33%.

Особливості: вирізняється білим забарвленням квіток, має злегка в'язучий, терпкий, гірко-пряний смак. Гарний медонос.



ДЖЕКОН F1

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Петренко М.П., Бакуменко Н.В., Лісичин В.М., Плужнікова Л.Є., Кривець Д.О., Позняк О.В.
Термін дозрівання, діб: 38-43, середньоранній.
Форма (тип) плоду: циліндрична. **Тип рослини (сила росту):** індетермінантний, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене зі світлими смугами до 1/3 плоду. **Довжина плоду, см:** 8-11. **Використання:** для споживання у свіжому вигляді, консервування та соління.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 32,6.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: Переважно жіночий тип цвітіння, товарність плоду 78%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 4,7 балів, солоних – 4,8 балів.



ДАРУНОК ОСЕНІ

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Петренко М.П., Позняк О.В., Плужнікова Л.Є., Кривець Д.О., Бакуменко Н.В.
Термін дозрівання, діб: 40, середньоранній.
Форма (тип) плоду: циліндрична. **Тип рослини (сила росту):** індетермінантний, сильноросла. **Забарвлення плоду:** темно-зелене. **Довжина плоду, см:** 10-14.
Використання: для споживання у свіжому вигляді.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 27,1.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: холодостійкий, плодоносить до перших приморозків, високі смакові якості плодів, плоди тривалий період не жовтіють.



НІЖИНСЬКИЙ ДАР

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Петренко М.П., Кривець Д.О., Позняк О.В., Птуха Н.І.
Термін дозрівання, діб: 46, середньопізній.
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): індетермінантний, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене. **Довжина плоду, см:** 10-12.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, консервування та соління.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 32,6.
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу.
Особливості: дегустаційна оцінка солоних плодів на рівні класичного Ніжинського місцевого огірка.



НІЖИНСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Місцевий сорт народної селекції, підтримувач сорту – ДС «Маяк» ІОБ НААН.
Термін дозрівання, діб: 48, середньопізній.
Форма (тип) плоду: видовжено-яйцевидна.
Тип рослини (сила росту): індетермінантний, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене. **Довжина плоду, см:** 10-12.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, консервування та соління.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 25,0.
Стійкість до хвороб: помірно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: стародавній місцевий сорт народної селекції. Відмінні смакові якості свіжих і солоних плодів.

ОГІРОК



НІЖИНСЬКИЙ 23

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Корнієнко С.І., Несин В.М., Позняк О.В., Ткалич Ю.В.
Термін дозрівання, діб: 45, середньопізній.
Форма (тип) плоду: видовжено-яйцевидна. **Тип рослини (сила росту):** індетермінантний, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене. **Довжина плоду, см:** 8-10.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, консервування та соління.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 33,6.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: сорт з високим виходом дрібних фракцій – пікулів і корнішонів; товарність плоду 80%, високі смакові якості солоних плодів.



САРМАТ F1

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Птуха Н.І., Ткалич Ю.В., Несин В.М., Позняк О.В., Кондратенко С.І..
Термін дозрівання, діб: 46, середньопізній.
Форма (тип) плоду: циліндрична. **Тип рослини (сила росту):** індетермінантний, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене. **Довжина плоду, см:** 11.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, консервування та соління.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 42,2.
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу.
Особливості: для отримання корнішонів, товарність плоду 86%, ніжинського сортипу: високі смакові якості плодів у засолці.

ПАСТЕРНАК



СТИМУЛ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори сорту: Позняк О.В., Кривець Д.О., Арутюнова В.М., Маленко А.М., Харицький М.В., Горова Т.К., Хареба В.В.
Достигання, діб: 155.
Призначення: як спеція у свіжому і переробленому вигляді. **Вміст:** сухої речовини – 24,27%, загальної цукру – 6,90%, аскорбінової кислоти – 10,38 мг%; **Коренеплід:** довжина, см – 25; ширина, см – 8. **Маса, г:** 470.
Форма коренеплоду: обернено-трикутна.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 66.
Стійкість до хвороб: стійкий.
Особливості: стійкий до стеблуння, придатний для механізованого збирання коренеплодів. Сорт вирізняється низьким рівнем накопичення нітратів.



ПУЛЬС

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори сорту: Позняк О.В., Чабан Л.В., Ткалич Ю.В.
Достигання, діб: 150. **Призначення:** як спеція у свіжому і переробленому вигляді. **Коренеплід:** довжина, см – 23; ширина, см – 9,2. **Маса, г:** 450-500.
Форма коренеплоду: широкообернено-трикутна.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 64.
Стійкість до хвороб: стійкий.
Особливості: Коренеплід з гладенькою поверхнею. Сорт високотехнологічний: придатний до механізованого збирання, на легких ґрунтах за достатнього зволоження коренеплоди висмикуються з ґрунту без підкопування. Стійкий до стеблуння в перший рік вегетації, коренеплоди можна залишати на зиму в ґрунті.

ПЕТРУШКА



СТИХІЯ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Верба Г.С., Арутюнова В.М.
Різновидність: кучеряволиста. **Достигання, діб:** 60, ранньостиглий. **Призначення:** як спеція у свіжому і переробленому вигляді.
Розетка: висота, см – 20-25; діаметр, см – 28-32. **Маса, г:** 130.
Листкова пластинка: згрупована, частки листка дещо загнуті догори, глибина розрізу часток – велика.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 35.
Стійкість до хвороб: стійкий.
Особливості: високоврожайний, високовітамінний. Рекомендується використовувати у свіжому вигляді, а також для переробки і консервної промисловості.



НАЙДА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автор: Позняк О.В.
Різновидність: коренеплідна. **Достигання, діб:** 150.
Призначення: як спеція у свіжому і переробленому вигляді. **Коренеплід:** довжина, см – 14,5; ширина, см – 5,3. **Маса, г:** 145.
Форма коренеплоду: широко-конічна.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 45.
Стійкість до хвороб: стійкий.
Особливості: стійкий до стеблуння. Товарність 94,5%. Коренеплід гладенький, без бічних коренів. Сорт придатний до механізованих технологій вирощування.

ПОЛИН ЕСТРАГОН (тархун)



УНЕНЕЖ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Позняк О.В., Кривець Д.О., Чабан Л.В., Хареба В.В., Хареба О.В.
Термін достигання, діб: від відростання до товарної стиглості – 60.
Призначення: як спеція у свіжому і висушеному вигляді.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 36.
Маса рослин з погонного метра, г: 1260.
Вміст: сухої речовини – 38,42%, загального цукру – 1,24%, аскорбінової кислоти – 19,95 мг/100 г.
Особливості: зимостійкий. Рослина сильно залистяна. Насіння в умовах Північного Лісостепу і Полісся України не утворюється, розмножується тільки вегетативно.



ЯНИЧАР

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автор: Позняк О.В.
Термін достигання, діб: від відростання до товарної стиглості – 60.
Призначення: як спеція у свіжому і висушеному вигляді.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 44.
Маса рослин з погонного метра, г: 1530.
Вміст: сухої речовини – 31,51%, загального цукру – 0,76%, аскорбінової кислоти – 21,0 мг/100 г.
Особливості: зимостійкий. Швидко розростається. Високі смакові і ароматичні якості свіжої продукції, придатний для використання у якості салатної культури.

САЛАТ ГОЛОВЧАСТИЙ



ДИВОГРАЙ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Горова Т.К.

Достигання, діб: 48-54.

Призначення: для свіжого споживання. **Вміст:** загального цукру – 1,6%, вітаміну С - 19,4 мг%.

Загальна урожайність, т/га: 32-59.

Маса, г: 150-250.

Особливості: дружнодостигаючий, врожайний, холодостійкий, високовітамінний.



ОЛЬЖИЧ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Горова Т.К., Хареба В.В.

Достигання, діб: 40-46.

Призначення: для свіжого споживання. **Вміст:** загального цукру – 1,1-1,3%, вітаміну С – 16,8-17,6 мг %.

Загальна урожайність, т/га: 25-32.

Маса, г: 250.

Особливості: дружнодостигаючий, врожайний, холодостійкий, високовітамінний.



ГОДАР

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Горова Т.К., Кривець Д.О., Позняк О.В.

Достигання, діб: 30-40.

Призначення: для свіжого споживання. **Вміст:** сухої речовини – 6,5%, загального цукру - 1,9%, вітаміну С - 16 мг%.

Загальна урожайність, т/га: 19-23.

Маса, г: 70-100.

Особливості: дружнодостигаючий, врожайний, холодостійкий, високовітамінний.

САЛАТ ЛИСТКОВИЙ



ЗОЛОТИЙ ШАР

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В.

Достигання, діб: 25-30.

Призначення: для свіжого споживання.

Вміст: загального цукру 0,9-1,1%, вітаміну С - 17-18 мг%.

Загальна урожайність, т/га: 25.

Маса, г: 120-150.

Особливості: декоративний, дружнодостигаючий, врожайний, холодостійкий, високовітамінний.



ШАР МАЛИНОВИЙ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Горова Т.К.

Достигання, діб: 25-30.

Призначення: для свіжого споживання.

Вміст: загального цукру 0,9-1,2%, вітаміну С - 17-18 мг%.

Загальна урожайність, т/га: 25.

Маса, г: 120-160.

Особливості: декоративний, дружнодостигаючий, врожайний, холодостійкий, високовітамінний.



СНІЖИНКА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Горова Т.К., Кривець Д.О., Дяченко І.І., Позняк О.В., Барабаш О.Ю.

Достигання, діб: 20-25.

Призначення: для свіжого споживання.

Вміст: загального цукру 1,8-2,0%, вітаміну С - 18,6-18,8 мг%.

Загальна урожайність, т/га: 20.

Маса, г: 120-160.

Особливості: декоративний, дружнодостигаючий, врожайний, холодостійкий, високовітамінний.



СПАЛАХ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В.

Достигання, діб: 20.

Призначення: для свіжого споживання.

Вміст: загального цукру 1,5%, вітаміну С - 19,1 мг%.

Загальна урожайність, т/га: 30.

Маса, г: 250-350.

Особливості: декоративний, дружнодостигаючий, врожайний, холодостійкий, високовітамінний.

САЛАТ ЛИСТКОВИЙ



КРУТЯНСЬКИЙ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Ткалич Ю.В., Корнієнко С.І., Несин В.М., Кондратенко С.І., Позняк О.В., Хареба О.В., Горова Т.К.

Достигання, діб: 39.

Призначення: для свіжого споживання. **Вміст:** сухої речовини – 9,54%, загального цукру – 1,23%, аскорбінової кислоти – 27,9 мг/100 г.

Загальна урожайність, т/га: 9,5. **Маса, г:** 100.

Особливості: декоративний, дружнодистигаючий, врожайний, холодостійкий, високовітамінний.

САЛАТ РОМЕН



СКАРБ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Позняк О.В., Кривець Д.О., Харицький М.В., Лещук Н.В.

Достигання, діб: 48.

Призначення: для свіжого споживання. **Вміст:** загального цукру – 1,50%, аскорбінової кислоти – 20 мг/100 г.

Загальна урожайність, т/га: 32. **Маса, г:** 560.

Особливості: посухостійкий, дружнодистигаючий, врожайний, холодостійкий, високовітамінний.

ПОРТУЛАК ГОРОДНІЙ (овочевий)



СВІТАНОК

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Чабан Л.В., Позняк О.В., Кривець Д.О., Дзюба Л.Б.

Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 21.

Призначення: для свіжого споживання і кулінарної обробки. **Вміст:** сухої речовини – 7,01%, загального цукру – 0,56%, аскорбінової кислоти – 34,65 мг/100 г.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 40.

Маса рослини, г: 550.

Особливості: високовітамінний, придатний до загущених посівів.

ФІЗАЛІС ОПУШЕНИЙ (суничний)



НЕКТАР

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Позняк О.В., Чабан Л.В., Ткалич Ю.В.

Термін дозрівання, діб: 100, середньостиглий.

Тип рослини (сила росту): детермінантний. **Форма (тип)**

плоду: округла. **Маса плоду, г:** 2,5. **Забарвлення плоду:** жовте. **Врожайність у відкритому ґрунті, т/га:** 12,0.

Використання: для споживання у свіжому вигляді і переробки. **Стійкість до хвороб:** стійкий до фітофторозу.

Особливості: містить у плодах: розчинної сухої речовини – 11,33%, загального цукру – 10,13%, аскорбінової кислоти – 43,99 мг/100 г; титрована кислотність 0,48%. Придатний для безрозсадного вирощування, споживання у свіжому вигляді і для переробки. Універсального використання.

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА



МАЯК

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Фесенко Л.П., Фесенко І.В., Барабаш О.Ю., Тимчук В.М., Дяченко І.І., Хареба В.В.

Напрямок використання: універсальний, гострий.

Вегетаційний період, діб: 110-120.

Урожайність, т/га: 26.

Форма цибулин: округлоплеската.

Колір покривних лусок: світло-фіолетові, з рожевим епідермісом.

Колір соковитих лусок: білі, з рожевим епідермісом.

Маса цибулин, г: 80-150. **Вміст сухої речовини, %:** 15-18.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.

Особливості: придатний для одно- і дворічної культури, вирізняється високою лежкістю – 95-99%.



ЗАГРАВА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Фесенко Л.П., Фесенко І.В., Позняк О.В.

Напрямок використання: універсальний, гострий.

Вегетаційний період, діб: 118-125. **Урожайність, т/га:**

26-35. **Форма цибулин:** округла. **Колір покривних лусок:**

червоний. **Колір соковитих лусок:** червонуватий.

Маса цибулин, г: 160. **Вміст сухої речовини, %:** 15.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.

Особливості: для вирощування в однорічній культурі, висока лежкість – 97-98%, привабливий зовнішній вигляд.

ЦИБУЛЯ СКОРОДА (ШНІТ)



ПЕРЛИНА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Фесенко Л.П., Позняк О.В., Фесенко І.В.

Напрямок використання: універсальний, гострий.

Вегетаційний період, діб: 110-122.

Урожайність, т/га: 26-38.

Форма цибулин: округла.

Колір покривних лусок: білий.

Колір соковитих лусок: білий.

Маса цибулин, г: 107-128. **Вміст сухої речовини, %:** 10,09.

Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.

Особливості: високі смакові якості, придатний для вирощування в однорічній культурі.



ЛАСТІВКА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.

Автори: Позняк О.В., Чабан Л.В., Фесенко Л.П.

Термін дозрівання, діб: від відростання листків до технічної стиглості пера – 18.

Маса рослини, г: 580.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 41,1.

Листя: довжина – 48 см, ширина – 0,8 см.

Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу.

Використання: для свіжого споживання.

Особливості: зимостійкий; придатний для вигонки пера у несезонний період, перо ніжне, з високими смаковими якостями.

ЦИБУЛЯ БАТУН



ВЕСНЯНИЙ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Фесенко Л.П., Ткалич Ю.В., Позняк О.В., Фесенко Я.І.
Термін дозрівання, діб: від відростання листків до технічної стиглості пера - 30.

Маса рослини, г: 610. **Загальна врожайність зеленої маси, т/га:** 46,8. **Листя:** довжина – 52 см, ширина – 2,4 см.
Стойкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.

Використання: для свіжого споживання.
Особливості: зимостійкий, стійкий до стеблущання у перший рік вегетації, придатний для вигонки пера у несезонний період.

ЧАБЕР САДОВИЙ



ОСТЕР

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Дяченко І.І., Хареба В.В., Горова Т.К., Позняк О.В.

Достигання, діб: 14, ранньостиглий.

Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа у харчовій промисловості.

Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 30.

Рослина: висота - 37-39 см, діаметр – 29-32 см.

Особливості: холодостійкий, стійкий до хвороб, шкідників, вилягання, з високими ароматичними якостями. У кулінарії чабер використовується як самостійно, так і у суміші з іншими прянощами. Має лікарські властивості. Сік рослини має заспокійливу дію і зменшує набряк при укусах бджіл. Заварений як чай зменшує біль і знімає спазми у шлунку і кишківнику.

ЦИКОРІЙ КОРЕНЕПЛІДНИЙ



ЦЕЗАР

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Чабан Л.В., Позняк О.В., Кривець Д.О., Дзюба Л.Б., Горова Т.К.

Різновидність: коренеплідна. **Достигання, діб:** 160.

Призначення: для вигонки головочок у несезонний період. **Коренеплід:** довжина, см – 26; ширина, см – 93.

Маса, г: 430. **Форма коренеплоду:** вузько-конічна.

Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 60,5.

Стойкість до хвороб: стійкий.

Особливості: У якості салатної продукції споживають молоді прикореневі листки. Коренеплоди можна використовувати для виготовлення сурогату кави.

ЧОРНУШКА ПОСІВНА (нігела)



ІВОЛГА

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Хареба В.В., Горова Т.К., Позняк О.В.

Достигання, діб: 120. **Призначення:** насіння як приправа у харчовій промисловості.

Загальна врожайність насіння, т/га: 0,8 -1,2.

Використання: в хлібопекарській промисловості, при солінні капусти, огірків, помідорів, приготуванні компотів, желе і ін.; в салатах ранньою весною; для прикрашення газонів, клумб, при складанні свіжих і сухих букетів.

Особливості: холодостійкий, стійкий до хвороб, шкідників, вилягання. Рослина лікарська, містить ефірну (0,8-1,4%) та жирну (28-35%) олії, глюкозиди, сапоніни, алкалоїди (нігелін), гіркі та біологічно активні речовини, мінеральні солі, вітаміни. Використовують як сечогінний, жовчогінний, судинорозширювальний та молокогінний засіб.

ШПИНАТ ГОРОДНІЙ



КРАСЕНЬ ПОЛІССЯ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Чабан Л.В., Позняк О.В., Горова Т.К., Хареба В.В.

Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 21. **Призначення:** для свіжого споживання і кулінарної обробки. **Загальна врожайність зеленої маси, т/га:** 18-25. **Маса рослини, г:** 140.

Вміст: сухої речовини – 6,9%, загального цукру – 0,3%.

Особливості: стійкий до стеблуння, придатний до загущених посівів.



ФАНТАЗІЯ

Компанія-оригіатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Чабан Л.В., Позняк О.В., Кривець Д.О., Дзюба Л.Б., Горова Т.К.

Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 21. **Призначення:** для свіжого споживання і кулінарної обробки. **Загальна врожайність зеленої маси, т/га:** 22. **Маса рослини, г:** 156.

Вміст: сухої речовини – 7,2%, загального цукру – 0,4%.

Особливості: стійкий до стеблуння, придатний до загущених посівів.



ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА

Адреса:

62478, Україна, Харківська обл., Харківський р-н.,

сел. Селекційне, вул. Інститутська, 1,

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

тел.: (057) 748-91-91 E-mail: ovoch.iob@gmail.com

www.ovoch.com

