

## СОРТ ЦИБУЛІ ШАЛОТУ ДРУЖОК

Сорт отримано шляхом індивідуального клонового добору з гібридної популяції цибулі шалот. Батьківськими формами слугували місцеві форми цибулі шалот Донецької, Харківської, Запорізької областей та сорт Кущівка харківська.

Сорт ранньостиглий, вегетаційний період 78–80 діб. Урожайність цибулин – 1,6 кг/м<sup>2</sup> (потенційна – 2,5 кг/м<sup>2</sup>), зелених листків – 4,1 кг/м<sup>2</sup> (потенційна – 5,7 кг/м<sup>2</sup>), маса рослини з цибулиною – 61 г (потенційна – 90 г). Збереженість цибулин за 8 місяців складає 91 %. Вміст сухої речовини у цибулинах – 16,0 %, загального цукру – 12,4 %. У зелених листках міститься загального цукру 2,3 %, вітаміну С – 29,9 мг/100 г.

Рослина формує від 30 до 43 листків темно-зеленого кольору, довжиною 36–56 см, положення їх – напівпряме. Форма цибулини – округла з індексом 1,0–1,1, маса середньої цибулини – 20,5 г, форма верхівки – злегка спадиста, форма основи – округла. Покривних лусок – 3–4 рожевого кольору. Соковиті луски – білі з червонуватим епідермісом. Товщина соковитих лусок – 0,2 см. Кількість зачатків – 3–7 шт. Цибулини є дуже щільними. Стрілкування за весняного садіння – 1,3 %. Сорт відзначається вирівняністю цибулин у «гнізді».

Вирощуванням та реалізацією цибулі шалот сорту Дружок займається Інститут овочівництва і баштанництва НААН.



Цибуля шалот сорт Дружок