

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА



АМФОРА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напря́м використання: універсальний, напівгострий.

Веgetаційний період, діб: 100-115.

Урожайність, т/га: 35-40. **Лежкість:** 6-7 місяців.

Форма цибулин: оберненояцеподібна.

Колір покривних лусок: темно-малиновий.

Колір соковитих лусок: білий зі світло-фіолетовим епідермісом.

Маса цибулин, г: 100-130.

Вміст сухої речовини, %: 12-13.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: високі смакові якості.



НОВИНКА

БЕЛЛА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напря́м використання: універсальний, гострий.

Веgetаційний період, діб: 102-104.

Урожайність, т/га: 30-40. **Лежкість:** 7-8 місяців.

Форма цибулин: округла та округло-плеската.

Колір покривних лусок: жовті з коричневим відтінком.

Колір соковитих лусок: зеленуватий.

Маса цибулин, г: 80-100.

Вміст сухої речовини, %: 14,8.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: тривалий термін зберігання.



ВАРЯГ

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напря́м використання: універсальний, гострий.

Веgetаційний період, діб: 106-110.

Урожайність, т/га: 30-35. **Лежкість:** 7-8 місяців.

Форма цибулин: округла та округло-плеската.

Колір покривних лусок: світло-коричневий.

Колір соковитих лусок: білий з жовтуватим відтінком.

Маса цибулин, г: 80-130.

Вміст сухої речовини, %: 12,5-13.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: висока щільність цибулин і лежкість.



ВЕСЕЛКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напря́м використання: салатний, напівгострий.

Веgetаційний період, діб: 92-115.

Урожайність, т/га: 30-40. **Лежкість:** 6-7 місяців.

Форма цибулин: округла та округло-плеската.

Колір покривних лусок: фіолетово-червоний.

Колір соковитих лусок: білі з фіолетовим епідермісом.

Маса цибулин, г: 100-160. **Вміст сухої речовини, %:** 12-13.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: дружне дозрівання і висока збереженість цибулин.

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА



ГЛОБУС

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напря́м використання: універсальний, напівгострий.

Веґетаційний період, діб: 100-115.

Урожайність, т/га: 40-60. **Лежкість:** 6-7 місяців.

Форма цибулин: округла та округло-овальна.

Колір покривних лусок: світло-коричневий.

Колір соковитих лусок: білий з салатним відтінком.

Маса цибулин, г: 150-200. **Вміст сухої речовини, %:** 10-11.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: великі соковиті цибулини, висока потенційна урожайність.



ЛЮБЧИК

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напря́м використання: універсальний, гострий.

Веґетаційний період, діб: 106-110.

Урожайність, т/га: 40-50. **Лежкість:** 7-8 місяців.

Форма цибулин: еліптична (сигароподібна).

Колір покривних лусок: золотисто-жовтий.

Колір соковитих лусок: білий з прозеленню у верхній частині.

Маса цибулин, г: 85-190. **Вміст сухої речовини, %:** 13-15.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: ½ цибулини знаходиться над поверхнею ґрунту, цибулина щільна, тонкі соковиті луски, зручна в кулінарній обробці, висока збереженість.



МАВКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напря́м використання: салатний, напівгострий.

Веґетаційний період, діб: 102-114, середньостиглий.

Урожайність, т/га: 30-37. **Лежкість:** 6-7 місяців.

Форма цибулин: плеската та округло-плеската.

Колір покривних лусок: фіолетово-червоний.

Колір соковитих лусок: білі з фіолетовим епідермісом.

Маса цибулин, г: 100-150. **Вміст сухої речовини, %:** 12-13.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: висока збереженість цибулин.



ТКАЧЕНКІВСЬКА

Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Напря́м використання: універсальний, гострий.

Веґетаційний період, діб: 96-108.

Урожайність, т/га: 35-54. **Лежкість:** 7-8 місяців.

Форма цибулин: округла та округло-овальна.

Колір покривних лусок: жовто-коричневий.

Колір соковитих лусок: білий з прозеленню у верхній частині.

Маса цибулин, г: 110-150. **Вміст сухої речовини, %:** 12,5- 13,5.

Стійкість до хвороб: толерантність.

Особливості: висока врожайність та збереженість цибулин.